

Descriere Insecticid ACTELLIC 50 EC SYNGENTA 10 ml

Beneficii client:

- insecticid pentru combaterea daunatorilor din culturile de camp, furajere si in depozite
- insectele sunt distruse prin contact, ingestie sau actiune fumigena
- se aplica foarte usor
- efect rapid si vizibil
- eficient pentru majoritatea legumelor si pomilor fructiferi

Avantaje produs:

- poate fi aplicat sub forma de pulverizare sau prafuire
- se aplica in doze mai mici decat alte insecticide
- datorita persistentei sale indelungate, nu este necesara reaplicarea lui

Descriere:

ACTELLIC 50 EC este un insecticid Syngenta pentru combaterea daunatorilor din culturile de camp, furajere si in depozite. Insectele sunt distruse prin contact, ingestie sau actiune fumigena.

Poate fi aplicat sub forma de pulverizare sau prafuire.

Datorita persistentei sale indelungate, nu este necesara reaplicarea lui. mp de pauza: 28 de zile la grau 21 de zile la mar, lucerna, rosii, pomi fructiferi, vita de vie.

Mod de utilizare:

Tratament samanta de consum

Tratament "sandwich": se vor efectua tratamente la fiecare 10-15 cm din stratul de seminte. Se recomanda: 10ml produs/1 L de apa/tona de seminte. In caz de necesitate se vor aplica si alte metode de dezinsectie, cum ar fi:

Fumigatia: se va folosi un produs special creat in acest scop, lasandu-se camera tratata inchisa timp de 4-5 ore, pentru depunerea particulelor pe toata suprafata tratata.

Cerealele tratate pot fi consumate de oameni si animale imediat dupa tratare. Cerealele tratate pot fi semanate cat de curand este nevoie dupa tratare.

Cultura	Daunatorul	Doza	Doza pentru 10 ml
Mar	Viermele marului (<i>Cydia pomonella</i>)	0,05%	10 ml/20 L apa
Prun	Viermele prunelor (<i>Cydia funebrana</i>)	0,05%	10 ml/20 L apa
Grâu	Ploșnițele cerealelor (<i>Eurygaster spp.</i>)	1,0 l/ha	
	Tripsul grâului (<i>Haplothrips tritici</i>)	2,4 l/ha	
Lucernă	Tântarul florilor de lucernă (<i>Contarinia medicaginis</i>)	1,0 l/ha	
	Viespea semințelor de lucernă (<i>Bruchophagus roddi</i>)	1,0 l/ha	
Legume seră	Musulita albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,1%	10 ml/10 L apa
Varză	Paduchele cenușiu al verzei (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0,05%	10 ml/20 L apa
Tomate	Paduchele solanaceelor (<i>Macrosiphum solani</i>)	0,1%	10 ml/10 L apa
Pomi fructiferi	Păianjenul din San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	0,2%	10 ml/5 L apa
Cireș	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,05%	10 ml/20 L apa
Vita de vie	Molia viței de vie – eudemisul (<i>Lobesia botrana</i>)	0,1%	10 ml/10 L apa
Spați de depozitare	Daunatori de depozite: Gărgărița grâului (<i>Sitophilus granaries</i>), Gărgărița orezului (<i>Sitophilus oryzae</i>), Gândacul din Surinam (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), Gândăcelul făinii (<i>Tribolium confusum</i>), Gărgărița fasolei (<i>Acanthoscelides obsoletus</i>), Molia cerealelor – adulți (<i>Sitotoga cerealella</i>), Molia cenușie a făinii (<i>Ephestia kuehniella</i>), Molia fructelor uscate (<i>Plodia interpunctella</i>)	1 % (50-100ml/100mp)	10ml/1 L apă/ 10-20mp
Spați de depozitare	Cereale depozitate (sămânță de consum)	10 ml p.c./tona cereale/1 litru apă	10ml/1 L apă/tona seminte

Specificatii

Ambalaj - Fiola

Concentratie substanta activa - Pirimifos metil 500 g/l

Dozaj - 10 ml pentru mar, 10 ml/20 L apa pentru prun, 1,0 l/ha pentru grau, 1,0 l/ha pentru lucerna

Timp de pauza - 28 de zile la grau, 21 de zile la mar, lucerna, rosii, pomi fructiferi, vita de vie

Tip cultura - Grau, Vita de vie, rosii, Lucerna, Mar, Pomi fructiferi

Clasa daunatori - Paduchele solanaceelor, Plosnita cerealelor, Molia vitei de vie, Paduchele cenușiu, Tripsi, Tantarul florilor de lucerna, Paianjenul din San Jose, Gargarita graului, Gargarita orezului, Gandacul din Surinam, Gargarita fasolei, Molia cerealelor, Molia fructelor uscate, Paianjenul rosu, Viermele marului, Viermele prunului, Musculita alba, Gandacul fainii, Molia cenușie a fainii

Substanta activa - Pirimifos metil

Tip produs - Insecticid