

100 g unguent contin: streptomocina 2.0 g sub forma de sulfat de streptomocina, benzilpenicilina potasica 2.000.000 u.i. si excipienti: parafina solida, stearat de aluminiu, parafina lichida.

Indicatii:

Sterptomocina este un antibiotic aminoglicozidic cu efect bactericid fata de bacili Gram-pozitivi (*Corynebacterium* sp.), bacili Gram-negativi (*Escherichia Coli*, *Klebsiella*), coci Gram-pozitivi (*Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp.). are efect bactericid de tip absolut deoarece actioneaza la nivelul ribozomilor impiedicand definitiv sinteza proteinelor bacteriene.

Benzilpenicilina este un antibiotic beta-lactamic cu efect bactericid fata de majoritatea cocilor Gram-pozitivi (*Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp.) bacili Gram-pozitivi (*Corynebacterium* sp.), bacili Gram-negativi (*Escherichia Coli*) Are efect bactericid degenerativ deoarece impiedica formarea peretelui celular bacterian. Este activa numai pe celulele bacteriene aflate in faza de multiplicare activa.

Prin intermediul celor doua antibiotice pe care le contine Asocilin este activ fata de coci si bacili Gram-pozitivi si Gram-negativi, implicati in infectii cutanate si oculare si in infectii ale glandei mamare.

Asocilin este indicat in tratamentul unor afectiuni ale pielii (abcese, furuncule, fistule, plagi), cheratite, blefarite, conjunctivite, otite externe si mastite produse de coci si bacili Gram-pozitivi si Gram-negativi sensibili la streptomocina si benzilpenicilina.

Contraindicatii:

Nu se administreaza la animale cu hipersensibilitate cunoscuta la antibioticele din compozitia produsului.

Reactii adverse:

Nu se cunosc. Daca observati reactii adverse sau alte efecte nedorite adresati-va medicului veterinar.

Specii tinta:

Bovine, caini, pisici

Administrare si doza:

Tratamentul afectiunilor pielii la bovine, caini si pisici: pe zona afectata, curatata si dezinfectata in prealabil se aplica un strat subtire si continuu de Asocilin de 1-3 ori/zi, in functie de gravitatea cazului, pana la vindecare.

Tratamentul infectiilor oculare la bovine, caini si pisici: se introduce unguentul in sacul conjunctival de 1-3 ori/zi, in functie de gravitatea cazului, pana la vindecare.

Tratamentul mastitelor la vaci: se introduce 1/4-1/2 din continutul tubului de unguent, cu ajutorul alonjei, prin canalul galactofor, in compartimentele afectate, care in prealabil au fost mulse si curatate cu o solutie

dezinfectanta. Se maseaza ugerul si nu se mulge timp de 12-18 ore, dupa care se repeta tratamentul, folosindu-se la tubul cu unguent o noua alonja. daca ameliorarea nu este evidenta cantitatea administrata in zilele urmatoare se dubleaza pana la disparitia simptomelor. Tratamentul se continua inca doua zile dupa remiterea simptomelor.

Recomandari privind administrarea corecta:

Pentru reusita tratamentului mastitelor la vaci trebuie procedat astfel: se izoleaza animalele bolnave de cele sanatoase si se iau masuri de igiena

Se dezinfecteaza ugerul animalului bolnav si mainile mulgatorului inainte de muls

Se tine tubul in apa calda, 35°-40°C, inainte de intrebuintare, pentru o mai usoara introducere a medicamentului

Alonja care insoteste tubul de unguent se sterilizeaza prin fierbere

Sferturile afectate se vor mulge obligatoriu dupa mulgerea sferturilor sanatoase, iar laptele se va colecta separat si nu se va utiliza in alimentatia omului sau hrana animalelor.

Se adapteaza alonja din polietilena la tubul cu medicament.

Prin manipulare usoara, pentru a evita ranirea mucoasei, se introduce alonja prin orificiul mamelonului si se preseaza tubul pana ce 1/6 din continutul acestuia este depus cat mai spre baza.

Se retrage alonja si se introduce intr-un vas cu dezinfectant dupa care se distruge.

Se maseaza usor ugerul dupa introducerea medicamentului

In cazul mastitelor acute tratamentul se repeta la 12 ore, iar in cazul mastitelor cronice la 12-24 ore pana la vindecare. In cazuri grave se recomanda asocierea cu tratament cu sulfamide sau antibiotice pe cale generala.

Perioada de asteptare:

Carne-28 zile, lapte-7 zile de la ultima administrare

Contraindicatii si precautii:

Nu se administreaza la animale alergice la antibioticele din componenta medicamentului.

Precautii speciale pentru depozitare:

A nu se lasa la indemana si vederea copiilor

A se pastra la temperaturi sub 25°C

A se pastra in ambalajul original

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj

Atentionari speciale: nu sunt.

Precautii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deseurilor, dupa caz:

Medicamentele nu trebuie aruncate impreuna cu deseurile menajere sau apele reziduale. Aceste masuri contribuie la protectia mediului.

Mod de prezentare:

tub cu 20 g unguent tip suspensie si alonja din polietilena

Termen de valabilitate:

2 ani, pastrat in ambalaj original

Producator:

Antibiotice S.A. str. Valea Lupului, nr. 1, 707410, Iasi Romania

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.