

PROSPECT

Biocan R inj. ad us. vet.

Vaccin antirabic inactivat

COMPOZITIA: per 1 ml

min. 2 U.I.

- Virus rabic inactivat

- Nutrientum MEM, Algedratum, Thiomersalum.

FORMA FARMACEUTICA: Solutie injectabila

GRUPA FARMACOTERAPEUTICA: 97 Veterinaria immunopreparata

CLASIFICAREA ATC :

Q15AA Vaccinuri veterinare

MODUL DE ACTIUNE: Dupa patrunderea in organismul animal, antigenul prezent in vaccin este recunoscut ca si un agent strain si se activeaza o serie de mecanisme de aparare (macrofage, opsonine, interferukine, linfocte B etc.). In urma carora se formeaza anticorpi specifici impotriva antigenului determinant, continut in vaccin. Mecanismele amintite vor preveni aparitia infectiilor ulterioare dupa contaminare.

Animalele se pot vaccina incepand cu varsta de 3 luni. Imunitatea de protectie apare in 14 zile dupa vaccinare. Animalele care au fost vaccinate inainte de a implini varsta de 3 luni, trebuie revaccinate dupa implinirea acestei varste (se va respecta intervalul de minim 14 zile dintre doua vaccinari consecutive). Animalele care au fost vaccinate pentru prima data la varsta cuprinsa intre 3 si 12 luni trebuie revaccinate la un an de la prima vaccinare. Revaccinarea la un an de la prima vaccinare va asigura protectia animalelor imunizate fata de rabie min. 2 ani. Pentru mentinerea imunitatii se recomanda revaccinarii in conformitate cu reglementarile in domeniu ale fiecarei tari.

SPECILE TINTA: Cainii, pisicile, animalele de blana, caii, oile, caprele, porcii.

TIMP DE ASTEPTARE: Nu are.

INDICATII: Imunizarea activa a speciilor tinta impotriva rabiei.

CONTRAINDICATII: Boli febrile grave. Animalele care au fost agresate sau au venit in contact cu animale turbate, nu se vor vaccina. Animalele care au muscat sau au zgariat oameni, se pot vaccina numai dupa terminarea perioadei de observatie a acestora.

PREPARATULUI: Inainte de utilizare agitati bine continutul flaconului. Se vor vaccina numai animalele clinic sanatoase, in stare buna de intretinere. Eventualele tratamente antiparazitare trebuie efectuate cu cel putin 10 zile inainte de vaccinare. Nu este recomandat ca animalele vaccinate sa fie supuse antrenamentului sau efortului timp de o saptamana dupa vaccinare. Dupa deschidere, trebuie utilizat in termen de 8 ore.

INTERACȚIUNI CU ALTE PREPARATE VETERINARE ȘI ALTE TIPURI DE INTERACȚIUNI:

Vaccinul Biocan R poate fi utilizat separat, simultan sau în asociere cu alte vaccinuri Biocan.

A/ Vaccinul Biocan R poate fi utilizat ca și diluant pentru alte vaccinuri lizilizate Biocan (de exemplu DHPPI, DP, P).

B/ Vaccinul Biocan R poate fi utilizat simultan cu vaccinul lizilid Biocan C, Biocan B, Biocan M și Biocan L.

Schema de vaccinare recomandată Biocan este:

Varsta cailor	Situația infectiei
5-12 săptămâni	favorabilă
7-12 săptămâni	nefavorabilă parvoviroza
8-10 săptămâni	Puppy (P) + C Puppy (P) + C DHPPI + LR
12-16 săptămâni	DHPPI + LR DHPPI + LR DHPPI + LR
Revaccinarea anuală	DHPPI + LR DHPPI + LR

Nota:

Vaccinurile din paranteză reprezintă posibilitatea vaccinarilor alternative în locul vaccinului Biocan Puppy.

Vaccinurile marcate cu +C și +L reprezintă posibilitatea administrării simultane sau în asociere cu alte vaccinuri Biocan (de exemplu DHPPI, DHP, DHPPI, Puppy).

Alte vaccinuri posibile: Biocan M – vaccin împotriva Microsporidii canis la câini, Biocan B – vaccin împotriva bolii Lyme la câini, Biocan T – vaccin împotriva tetanosului la câini.

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE: Doza este de 1 ml indiferent de vârsta, greutatea sau rasa/individul. Se poate administra începând cu vârsta de 12 săptămâni.

Metoda de administrare: subcutanată, preferabil în apoaia spetei.

Animalele se vaccinează începând cu vârsta de 3 luni. Imunitatea de protecție se formează după 14 zile de la înțuzare. Animalele vaccinate la vârsta (se va respecta intervalul minim de 14 zile dintre două vaccinări consecutive). Animalele vaccinate la vârsta cuprinsă între 3 și 12 luni trebuie revaccinate la un an după prima vaccinare. Revaccinarea trebuie făcută la un an după prima vaccinare. Revaccinarea împotriva rabiei pentru minim 2 ani. Pentru menținerea imunității se recomandă revaccinarea periodică în conformitate cu reglementările în domeniul din fiecare țară.

EFFECTE SECUNDARE: La locul de inoculare se poate forma o reacție locală de mărirea unui bob de mazăre. Această dispare în 3 săptămâni. Numai excepțional se poate constata hipersensibilitate.

PREZENTARE:

A/ Cutii de plastic cu capac și 10 flacoane:

10 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan R

B/ Cutii de plastic cu capac și 20 flacoane:

20 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan R

C/ Cutii de plastic cu capac și 100 flacoane:

50 flacoane x 1 ml, 100 flacoane x 1 ml vaccin Biocan R

D/ Cutii de plastic cu capac 10 flacoane:

1 flacon x 5 ml, 5 flacoane x 5 ml, 10 flacoane x 5 ml vaccin Biocan R

E/ Cutii de carton:

1 flacon x 10 ml, 5 flacoane x 10 ml, 10 flacoane x 10 ml, 1 flacon x 20 ml, 5 flacoane x 20 ml, 10 flacoane x 20 ml, 1 flacon x 50 ml, 1 flacon x 100 ml vaccin Biocan R

Prospectul face parte din fiecare ambalaj.

PASTRARE: Depozitați într-un loc uscat și întunecos, la temperaturi de 2 - 8 °C.

Vaccinul trebuie ferit de îngheț.

Preparatul nu trebuie utilizat după expirarea termenului de valabilitate înscris pe ambalaj.

MASURI SPECIALE PRIVIND MANIPULAREA PREPARATELOR VETERINARE NEFOLOSITE SAU A DESEURILOR PROVENITE DE LA ACESTE: Ambalajul și orice resturi din preparat se vor manipula în concordanță cu reglementările în vigoare.

VALABILITATEA: 24 luni, 7 zile după prima deschidere a flaconului.

PRODUCATOR: Bioveia, a.s. Komenského 242, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehia

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

A SE ELIBERA NUMAI PE BAZA DE PRESCRIPȚIE MEDICALĂ

NUMARUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

A SE ELIBERA NUMAI PE BAZA DE PRESCRIPȚIE MEDICALĂ

NUMARUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

