

Borgal 24% fl*100 ml,inj

Specie	Cabaline, Rumegatoare, Porcine		
Compoziție	1 ml contine: 200 mg sulfadoxin si 40 mg trimetoprim.		
Indicații	La bovine, cabaline, suine si ovine in infectii bacteriene primare si secundare celor virale ale tractului respirator, gastrointestinal, urogenital, pielii si articulare.		
Doze și mod de administrare	Doza standard la toate animalele este de 15 mg substanta activa/kg greutate corporala, deci 3 ml/50 kg greutate vie.		
	Specia si categoria de animale	Doza	Mod de administrare
	Adulti: vaci, cai	20 – 30 ml	Vaci: i.v.,i.m.
	Juninci, minji	5 – 15 ml	Cai: preferabil i.v., lent i.m
	Vitei	3 – 5 ml	
	Scroafe cu purcei	8 – 12 ml	Porci: i.m. sau s.c.
	Porci la ingrasat	5 – 8 ml	
	Purcei de 4-6 luni	2,5 – 3 ml	
	Purcei intarcati	1 – 2 ml	
	Purcei sugari	0,5 – 1 ml	
Oi	3 – 5 ml	i.v. sau i.m.	
Miei	0,5 – 1 ml		
Doza se poate repeta la interval de 24 – 48 ore, in functie de efectul clinic.			
Precauții	Nu se administreaza animalelor cu insuficienta renala sau hepatica grava si celor cu hipersensibilitate la sulfamide sau cu probleme ale sistemului hematopoietic. Nu se administreaza cailor sedati cu alpha2 agonisti.		
Contraindicații	Nu se administreaza animalelor cu insuficienta renala sau hepatica grava si celor cu hipersensibilitate la sulfamide sau cu probleme ale sistemului hematopoietic. Nu se administreaza cailor sedati cu alpha2 agonisti.		
Prezentare	Flacon de 100 ml sau 50 ml.		
Condiții de depozitare	La temperatura camerei (15 – 25 °C) si la intuneric.		
Actiune	Cei doi componenti activi interfera la doua nivele diferite cu biosinteza bacteriana, rezultand o potentare a efectului antibacterian, ajungandu-se la efect bactericid, chiar la doze scazute.		
Timp de asteptare	Carne: 8 zile Lapte: 2 zile		

* Informațiile prezentate în această pagină nu țin loc de prescripție medicală.

Pentru administrarea produsului și alte informații suplimentare, trebuie să apelați la serviciile unui medic veterinar.