

Buscopan inj x 100 ml

Specie	Cabaline, Rumegatoare, Porcine, Caini
Compoziție	1ml contine:4 mg Butilscolopaminumbromid; 500 mg Metamizol Natrium; 5 mg fenol in solutie apoasa stabilizata.
Indicații	stari dureroase spastice in zona aparatului digestiv, cai biliare si aparat genitourinar Cai: colici spastice, colici in constipatia intestinului gros, obstructie esofagiana Bovine,vitei: diaree, colica spastica, timpanism functional pentru sustinerea terapiei timpanismului, obstructie esofagiana Porcine: diaree, gastroenterita, colica spastica. Caini: gastroenterita, diaree, varsaturi, spasme in sistemul urogenital, ileus functional. In gastroenterite in asociere dupa etiologie cu antibiotic sau antihelmintic. De evidentiat in mod deosebit efectul verificat in diverse diarei. Prin normalizarea peristaltismului, anulara spasmului si a durerii scaunul isi recapata imediat consistenta normala. In caz de infectii bacteriene sau parazitoze trebuie administrata in asociere o terapie cauzala (antibiotice, antihelmintice). Si la vitei, timpanismul functional ce se instaleaza frecvent este bine influentat. La alte timpanisme injectia cu buscopan usureaza introducerea sondei nazoesofagiene. Se va observa ca deja la introducerea sondei se instaleaza ructusul. O indicatie speciala este obstructia esofagului la bovine si cai.
Doze și mod de administrare	intravenos lent la cai, bovine, intramuscular la porci si la caini i.m. , i.v. , s.c.
Contraindicații	sensibilitate la unul din componentele preparatului, a nu se folosi la pisici
Reacții adverse	la cani apar ocazional imediat dupa injectare reactii dureroase, ele sunt diminuate prin administrare subcutanata.
Prezentare	100 ml.
Condiții de depozitare	nu peste 25 C, la adapost de lumina
Actiune	Buscopan compozitum este un spasmolitic cu actiune de lunga durata. Efectul se bazeaza pe ambele componente, care relaxeaza in mod specific spasmul si in acelesi timp inlatura durerea (derivatul de aminofenazona). Buscopan (hyoscin-n-butilbromid) detine un efect specific spasmolitic asupra musculaturii netede de la nivelul tractului digestiv, cailor biliare si organelor urogenitale. In doze terapeutice nu induce efecte secundare similare celor atropinice Noramidopyriniummethansulfonat-sodic actioneaza analgetic central, antipiretic si spasmolitic. Prin efectul spasmolitic conduce catre o diminuare a iritabilitatii musculaturii netede intestinale. Efectul spasmolitic este datorita efectului antiflogistic realizat prin impermeabilizarea vaselor cat si datorita imbunatatirii irigarii sanguine a musculaturii netede, dorita in terapie. In functie de modul de administrare si tabloul bolii, se instaleaza un efect de lunga durata, cca 4-6 ore. Aceasta se explica prin retentia buscopanului in circulatia enterohepatica si o secretie constanta in lumenul intestinal urmata de reabsorbtie. Din aceste considerente, de cele mai multe ori este suficienta o singura injectie pentru vindecare. De regula durerile cedeaza deja la sfarsitul injectiei intravenoase, iar la administrarea im. efectul se instaleaza dupa 20-30 min. Prin combinarea componentelor centralanalgetice si spasmolitice se va obtine un efect cuprinzator si in caz de colici si de stari spastice dureroase grave.
Timp de asteptare	tesuturi comestibile: 12 zile. A nu se administra la animalele ce produc lapte pentru consumul uman
Posologie	cai 20-30 ml; bovine 20-25 ml; vitei, porc 5-10 ml; purcei 1-2ml; caini 1-2,5 ml
Asocieri medicamentoase	noramidopyriniummethansulfonat de sodiu poate potentia efectul anticoagulantelor.
Termen de valabilitate	48 luni

* Informațiile prezentate în această pagină nu țin loc de prescripție medicală.

Pentru administrarea produsului și alte informații suplimentare, trebuie să apelați la serviciile unui medic veterinar.