



Butomidor® 10 mg / ml - Solutie injectabila pentru
pentru cal, caine, pisica
Substanta activa:

1 ml contine:

butorfanol (sub forma de tartrat):10 mg

Excipienti:

clorura de benzetoniu:..... 0,1 mg;

Clorura de sodiu;

Apa pentru preparate injectabile.

INDICATII:

CAL:

Ca analgezic

Pentru ameliorarea pentru scurt timp a durerii abdominale moderate pana la severa, cum ar fi colica asociata cu loviri intestinale si hipermotilitate.

Ca sedativ si pre-anestezic

In combinatie cu α_2 -adrenoceptor agonisti (detomidine, romifidine, xylazine):

Pentru proceduri terapeutice si de diagnostic cat si pentru manopere chirurgicale minore cu animalul „in picioare”

CAINE / PISICA:

Ca analgezic

Pentru durere severa, de exemplu pre-si post-chirurgicala cat si post-traumatica,

Ca sedativ

In combinatie cu α_2 -agonist adrenoceptor (medetomidine).

Ca pre-anestezic

Parte a regimului de anestezie (medetomidine, ketamina).

CONTRAINDICATII:

Nu se utilizeaza in caz de hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipienti

Nu se utilizeaza pentru tratamentul anim sau leziuni organice cerebrale si la animale cu boli respiratorii obstructive

Pentru utilizarea in asociere cu alfa-2-agonisti la cai:

Aceasta asociere nu trebuie utilizata in caz de aritmii cardiace pre-existente.

SPECII TINTA: Cal, caine, pisica