

BUTOX 50

Butox 50 mg/mL, concentrat pentru solutie cu aplicare cutanata pentru bovine si ovine

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

MSD Animal Health
Wim de Körverstr. 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons, F-27460 Igoville
France

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Butox 50 mg/mL, concentrat pentru solutie cu aplicare cutanata pentru bovine si ovine
Deltametrin

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Deltametrin 50 mg/mL
Acid citric monohidrat
Dodecilfenilsulfat de calciu
Polietoxilat tri-ter-butilfenol
2-Metoxietil acetat
Solvent aromatic C9

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Butox 50 este utilizat ca solutie pentru imbaiere sau sprayere pentru prevenirea și tratamentul infestărilor ectoparazitare la bovine și ovine cauzate de următorii paraziți: acarienii râiei, păduchi, căpușe și muște.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu există

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Apariția reacțiilor adverse trebuie să fie comunicate autorității competente.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine și ovine

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doar pentru uz extern.

Indicații	Cantitatea de Butox 50 necesară pentru 100 litri de apă		
	Tratament prin pulverizare	Tratament prin îmbaiere	Soluția de completare
		Soluția inițială	Soluția de completare
Scabie	100 ml	100 ml	150 ml
Paduchi	25 ml	25 ml	37.5 ml
Capuse/Purici	50 ml	50 ml	75 ml

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Schema de tratament recomandată:

Scabie: Pentru tratamentul curativ, se fac două administrări la interval de zece zile. Pentru tratamentul de rutină, se recomandă o singură administrare la fiecare șase luni.

Paduchi: De obicei, un singur tratament asigură protecție împotriva paduchilor, depinzând de gradul de infestare.

Capuse: Tratamentul trebuie repetat în funcție de gradul de infestare.

Muște: O singură aplicare oferă protecție împotriva muștelor pentru 6-8 săptămâni, în funcție de gradul de infestare, speciile de muște și condițiile meteorologice.

Modul de utilizare:

Îmbaierea:

a) Soluția inițială

Un pre-mix cu Butox 50 se face prin adăugarea unei cantități mici de apă la cantitatea necesară de Butox 50. Acest pre-mix este distribuit pe toată lungimea bazinului și agitat bine înainte de a se adăuga cantitatea rămasă de apă. Primele 20 de animale care vor trece prin bazin vor amesteca soluția și, prin urmare, trebuie să fie tratate de două ori.

b) Soluția de completare:

După tratamentul unei turme sau în cazul în care volumul soluției preparate a scăzut cu 10% din volumul său inițial, completări ale soluției inițiale trebuie să fie efectuate, adăugând cantitatea necesară de apă și Butox 50.

c) Instrucțiuni generale:

Înainte de a începe tratamentul prin îmbaiere, se amestecă bine soluția. Asigurați-vă că animalele nu sunt nici obosele, nici însetate înainte de tratament. Nu trata animalele în perioada arsitei.

Pulverizare:

Un pre-mix cu Butox 50 se face prin adăugarea unei cantități mici de apă la cantitatea necesară de Butox 50. Acest pre-mix se agită bine înainte ca la cantitatea rămasă să se adăuge apă.

Fiecare administrare trebuie să utilizeze o cantitate minimă de 3 litri de produs diluat pe animal, acordând o atenție deosebită la locurile preferate de paraziți.

Pentru tratamentul împotriva raiei, se recomandă un periaj preliminar.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Tesuturi comestibile: 0 zile (bovine).

4 zile (ovine)

Lapte: 0 zile

(Nu este utilizată laptele de la ovinele tratate pentru consum uman).

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. A se proteja de lumina directă a soarelui. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, a se păstra departe de hrana, bauturi și hrana pentru animale.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu se tratează animalele atunci când este arsă.

A nu se pulveriza împotriva vântului.

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălați imediat cu apă.

În cazul ingerării accidentale, solicitați asistență medicală imediat.

Purtați mănuși de protecție atunci când manipulați produsul sau a animalelor tratate recent.

Dacă hainele devin puternic contaminate, se vor scoate și spăla înainte de reutilizare.

Nu se cunosc.

Apariția reacțiilor adverse trebuie să fie comunicate autorității competente.

Unele insecticide organo-fosforice pot încetini rata metabolismului și prin aceasta pot mări toxicitatea deltametrinului. De aceea nu se recomandă utilizarea acestuia cu alte insecticide organo-fosforice.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Periculos pentru formele de viață acvatice. Nu se vor contamina lacuri, cursuri de apă, sau canale cu produs sau ambalaje folosite.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L., ILFOV,

Șos. De Centură Nr.27 – 28, Com. Chiajna

Tel: 021.311.83.11; Fax: 021.311.17
