



DESCRIERE

Flacon cu pulbere albă, cristalină, liofilizată însoțit de un flacon cu solventul pentru reconstituire.

COMPOZIȚIE

Fiecare flacon conține 1500 sau 5000 u.i. gonadotrofină corionică (CG). Volumul solventului însoțitor este de 5 ml/flacon.

MOD DE ACȚIUNE

Chorulon conține CG, o glicoproteină complexă. CG este o gonadotrofină cu activitate de hormon luteinizant (LH).

La femelă, CG poate fi folosit pentru:

- a stimula maturarea foliculului care se dezvoltă și a induce ovulația;
- a determina luteinizarea celulelor granuloase;
- a menține viața funcțională a corpului gaiben;
- a mări secreția de progesteron la nivelul celulelor luteinizate.

CG amplifică acțiunea FSH asupra creșterii ovarului.

La mascul, CG stimulează producția de testosteron, influențând astfel dezvoltarea și menținerea caracterelor sexuale masculine primare și secundare.

INDICAȚII

Chorulon poate fi utilizat pentru controlul tulburărilor de fertilitate la animalele domestice:

- ameliorarea ratei de concepție la femele (bovine);
- inducerea ovulației la femele (cabaline, câini);
- ovare chistice cu ciclu estral neregulat, ninfomanie, sau absența estrului la femele (cabaline);
- anestru la femele (cabaline, câini);
- ovulație întârziată, estru prelungit la femele (câini);
- deficiența libidoului și criptorhidism la masculi (câini).

CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

EFECTE ADVERSE

În cazuri rare, la scurt timp după injectare pot surveni reacții de tip anafilactoid, cum este posibil cu orice preparat proteic. În asemenea circumstanțe se indică medicația promptă cu adrenalină (1:1000 i.m., sau i.v.), sau cu glucocorticosteroizi.

DOZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Specia	Indicația	Dozarea	Administrare
Vacă,	Ameliorarea ratei de concepție	1500 u.i. la I.A. sau la montă	i.m., sau i.v.
Junincă	Ovare chistice (anestru, estru prelungit, ninfomanie)	3000 u.i.	i.v.
	Anestru (foliculi ≥ 2 cm în diametru)	1500-3000 u.i. cu repetare, dacă este necesar, după 2 zile	i.m., sau i.v.
lapă	Inducerea ovulației (foliculi $\geq 2,5$ cm în diametru)	1500-3000 u.i., 24 ore după I.A. sau montă	i.v.
	Anestru	după pretratamentul cu Folligon (PMSG): 500 u.i. în prima zi a estrului	i.m., sau i.v.
Cățea	Ovulație întârziată	100-800 u.i./zi cu repetarea tratamentului până la dispariția scurgerilor vaginale	i.m.
	Criptorhidism	100-500 u.i. de 2 ori pe săptămână timp de până la 6 săptămâni	i.m.
Câine	Deficiența libidoului	100-500 u.i. la 6-12 ore înainte de împerechere	i.m.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne: 0 zile
lapte: 0 zile

INCOMPATIBILITĂȚI ȘI INTERACȚIUNI

Trebuie evitat amestecul cu alte substanțe.

PRECAUȚII

U se impun.

UPRADOZARE

doze duble nu apar simptome clinice.

ĂSTRARE

ofilizat : la frigider (2-8°C) și la întuneric.
onstituit : 12 ore la temperatura de 8-15°C și la întuneric.

REZENTARE

Cutie cu 5 flacoane x 1500 u.i. și 5 flacoane solvent.
Cutie cu 5 flacoane x 5000 u.i. și 5 flacoane solvent.

RECAUȚII PENTRU PRODUSUL NEÎNTREBUINȚAT ȘI AMBALAJE

se impun.

- anestru la femele (cabaline, câini);
- ovulație întârziată, estru prelungit la femele (câini);
- deficiența libidoului și criptorhidism la masculi (câini).

CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

EFECTE ADVERSE

În cazuri rare, la scurt timp după injectare pot surveni reacții de tip anafilactoid, cum este posibil cu orice preparat proteic. În asemenea circumstanțe se indică medicația promptă cu adrenalină (1:1000 i.m., sau i.v.), sau cu glucocorticosteroizi.

DOZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Specia	Indicația	Dozarea	Administrare
Vacă,	Ameliorarea ratei de concepție	1500 u.i. la I.A. sau la montă	i.m., sau i.v.
Junincă	Ovare chistice (anestru, estru prelungit, ninfomanie)	3000 u.i.	i.v.
	Anestru (foliculi ≥ 2 cm în diametru)	1500-3000 u.i. cu repetare, dacă este necesar, după 2 zile	i.m., sau i.v.
lapă	Inducerea ovulației (foliculi $\geq 2,5$ cm în diametru)	1500-3000 u.i., 24 ore după I.A. sau montă	i.v.
	Anestru	după pretratamentul cu Folligon (PMSG): 500 u.i. în prima zi a estrului	i.m., sau i.v.
Cățea	Ovulație întârziată	100-800 u.i./zi cu repetarea tratamentului până la dispariția scurgerilor vaginale	i.m.
	Criptorhidism	100-500 u.i. de 2 ori pe săptămână timp de până la 6 săptămâni	i.m.
Câine	Deficiența libidoului	100-500 u.i. la 6-12 ore înainte de împerechere	i.m.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne: 0 zile
Lapte: 0 zile

INCOMPATIBILITĂȚI ȘI INTERACȚIUNI

Trebuie evitat amestecul cu alte substanțe.

PRECAUȚII

Nu se impun.

SUPRADOZARE

La doze duble nu apar simptome clinice.

PĂSTRARE

Liofilizat : la frigider (2-8°C) și la întuneric.
Reconstituit : 12 ore la temperatura de 8-15°C și la întuneric.

PREZENTARE

a. Cutie cu 5 flacoane x 1500 u.i. și 5 flacoane solvent.
b. Cutie cu 5 flacoane x 5000 u.i. și 5 flacoane solvent.

PRECAUȚII PENTRU PRODUSUL NEÎNTREBUINȚAT ȘI AMBALAJE

Nu se impun.

Nr. și dată Licență: 39187/08.01.95

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Chorulon