

Depocillin

Depocillin 300 mg/ml suspensie injectabila pentru bovine, suine, ovine, cabaline, câini și pisici

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

Intervet Productions S.r.l.
Via Nettunese Km 20,300
04011 Aprilia (Latina)
Italia

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Depocillin 300 mg/ml suspensie injectabila pentru bovine, suine, ovine, cabaline, câini și pisici
Procain benzilpenicilină

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Substanță activă:

Procain benzilpenicilină 300 mg/ml

Excipienți:

Parahidroxibenzoat de metil 1.10 mg/ml

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

În tratamentul infecțiilor produse de bacterii sensibile la penicilină, de exemplu:

Bovine

Infecțiile cordonului ombilical cauzate de *Arcanobacterium pyogenes* și/sau *Streptococcus* spp.

Infecții podale la bovine, cauzate de *Dichelobacter nodosus* și/sau *Fusobacterium necrophorum*

Difteria vițelilor cauzate de *Fusobacterium necrophorum*

Prevenirea infectării plăgilor după operații.

Suine:

Infecții ale tractului respirator cauzate de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* și/sau *Pasteurella multocida*

Artrite cauzate de *Streptococcus* spp. și/sau *Staphylococcus* spp.

Meningite cauzate de *Streptococcus suis*

Erizipel cauzat de *Erysipelothrix rhusiopathiae*

Cabaline:

Infecții ale tractului respirator cauzate de *Streptococcus spp.*

Prevenirea infectării plăgilor în timpul operațiilor și după acestea.

Ovine:

Necroze podale cauzate de *Dichelobacter nodosus* și/sau *Fusobacterium necrophorum*

Câini:

Prevenirea infectării plăgilor în timpul operațiilor și după acestea cu *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, stafilococi coagulo-pozitivi și/sau *Pasteurella multocida*.

Pisici:

Prevenirea infectării plăgilor în timpul operațiilor și după acestea cu stafilococi coagulo-pozitivi.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează animalelor cunoscute ca fiind alergice la penicilină.

Nu se administrează în prezența stafilococilor care produc β – lactamază.

6. REACȚII ADVERSE

Ocazional au fost observate reacții alergice.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine, suine, ovine, cabaline, câini și pisici

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine și ecvine: 12 mg/kg (i.m.)

Ovine și suine: 15 mg/kg(i.m.)

Câini și pisici: 30 mg/kg (i.m sau s.c.)

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Intervalul între administrări: 24 de ore.

Tratamentul poate să dureze până la 5 zile.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine - carne și organe- 5 zile

Suine- carne și organe - 4 zile

Ovine- carne și organe- 4 zile

Bovine și ovine

Lapte: 12 mulsori (6 zile)

Carnea provenită de la cai tratați nu se dă în consum uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C), a nu se congela.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Rapelurile se administrează în puncte diferite.

A se păstra în ambalajul original.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la antibiotice β -lactamice trebuie să evite contactul cu produsul

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Depocillin este ambalat în flacoane de sticlă de 100 ml și 250 ml sau flacoane PET de 100 ml, 250 ml și 500 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L., ILFOV,

Șos. De Centură Nr.27 – 28, Com. Chiajna

Tel: 021.311.83.11/12/; Fax: 021.311.83.17
