

Suspensie sterilă.

Denumire și compoziție:

Denumire: **Excenel[®] RTU.**

Compoziție: Cefiofur Clorhidrat, echivalent cu 50 mg Cefiofur per mililitru.

Indicații:

Taurine: Pentru tratamentul următoarelor maladii bacteriene:

- afecțiuni respiratorii (pneumonii și bronhopneumonii, febră de transport), asociate cu *Mannheimia spp. (Pasteurella haemolytica)*, *Pasteurella multocida* și *Haemophilus somnus*.

- necrobaciloză interdigitală, pododermatite de diferite grade, asociate cu *Fusobacterium necrophorum* și *Bacteroides melaninogenicus*.

- metrite acute (0 – 14 zile post-partum) asociate cu infecții cu germeni sensibili la cefiofur.

Suine: Pentru tratamentul sau prevenția bolilor respiratorii bacteriene la suine asociate cu microorganismele sensibile la acțiunea compusului activ - Cefiofur: *Actinobacillus pleuro-pneumoniae (Haemophilus)*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* și *Streptococcus suis* tip 2.

Contraindicații:

Medicamentul nu se va administra animalelor care au prezentat hipersensibilitate la Cefiofur și la alte antibiotice din gama β -lactam.

Efecte secundare:

La unele animale s-au constatat la locul injectiei reacții ușoare, cum ar fi decolorarea fasciilor sau a țesutului adipos timp de până la 20 de zile de la momentul administrării.

Doze:

Suine: 3 mg cefiofur/kgcorp/zi, timp de 3 zile, pe cale intramusculară, ceea ce înseamnă 1 ml/16 kg greutate corporală la fiecare injecție.

Taurine: inoculare intramusculară sau subcutanată. În cazul afecțiunilor respiratorii sau al necrobacilozei interdigitale se va utiliza doza de 1 ml pentru 50 kg g.c.. Administrarea se va repeta la interval de 24 de ore, timp de 3 zile consecutiv. Tratamentul poate fi continuat și în ziua a 4-a și a 5-a la animalele care un au răspuns satisfăcător după primele 3 zile de tratament.

În cazul metritelor post-partum se va utiliza doza de 1 ml pentru 50 kg g.c. Administrarea se va face la 24 de ore timp de 5 zile consecutiv. Nu se vor inocula mai mult de 15 ml într-un punct de administrare.

Mod de administrare:

Intramuscular sau subcutanat.

Perioada de așteptare:

Taurine:

Lapte: 0 zile,

Carne: 8 zile.

Suine: carne și preparate din carne - 5 zile.

Conservare:

Produsul se păstrează la temperaturi sub 25°C. După prima folosire, timpul de utilizare este de 14 zile, la temperaturi sub 25°C.

Data expirării produsului (lună/an) este indicată pe pachet după inscripția "EXP.:" (EXP= data expirării).

Măsuri speciale de precauție:

Penicilinele și cefalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingerare sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la cefalosporine și peniciline poate conduce la sensibilitate încrucișată și viceversa. Ocazional, reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi serioase.

Nu manipulați acest produs dacă știți că sunteți hipersensibil.

Dacă în urma expunerii apar simptome, cum ar fi erupțiile cutanate, trebuie să contactați un personal medical calificat.

Dacă apar simptome mai grave, cum ar fi edemul pielii, buzelor, ochilor, contactați imediat doctorul.

Precauții speciale privind distrugerea produselor neutilizate:

Se va evita dispersarea produsului direct în mediul înconjurător.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !