

Ex Spot

Ex spot 65% w/w (0,731 g/ml) solutie spot on pentru câini

1. NUMELE SI ADRESA DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE SI A DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACA SUNT DIFERITE

Detinatorul autorizatiei de comercializare:

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxtmeer
Olanda

Producator pentru eliberarea seriei:

S-P Veterinary Ltd / Schering-Plough
Breakspear Road South, Harefield,
Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS,
Marea Britanie

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ex spot 65% w/w (0,731 g/ml) solutie spot on pentru câini

3. DECLARAREA (SUBSTANTEI) SUBSTANTELOR ACTIVE SI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml contine:

Permetrin 731 mg
Propilen glicol metil eter

4 INDICATIE (INDICATII)

Pentru combaterea (prevenire si tratament) puricilor, capuselor si paduchilor la câini.

Aditional, ex spot este eficace în tratamentul si prevenirea dermatitei alergice produse de purice.

5. CONTRAINDICATII

A nu se utiliza la pisici. A nu se utiliza la câini cu vârsta mai mica de 3 luni. Se exclud de la tratament câinii cu leziuni cutanate, în special în zona dorsala.

A nu se trata animalele bolnave sau în coalescenta.

6. REACTII ADVERSE

La locul aplicarii poate sa apara prurit. Ocazional, la locul aplicarii poate sa apara alopecie sau formare de vezicule. În anumite cazuri, în urma aplicarii prin apasare puternica asociata cu leziuni ale pielii poate duce la aparitia de reactii inflamatorii locale.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru aplicare locala. La câinii cu greutate de până 15kg greutate corporala — 1 ml între omoplati.
La câinii cu greutatea peste 15kg greutate corporala — 1 ml între omoplati si 1 ml la baza cozii.

9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA

Se da blana la o parte se se aplica cantitatea recomandata direct pe piele între omoplati, respectiv la baza cozii. Dupa tratament, 24 de ore trebuie sa se evite udarea câinelui. Câinii care au fost udati sau plouati, trebuie tratati înca o data. Tratamentul se poate repeta dupa 7 zile. O singura aplicare elimina puricii, capusele si paduchii si ofera protectie împotriva reinfestarii până la 4 saptamâni împotriva puricilor si capuselor. Pentru a evita reinfestarea cu purici si capuse, se va trata adapostul animalelor si în imediata apropiere a acestora cu substante corespunzatoare.

10. TIMP DE ASTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lasa la îndemâna copiilor.

A nu se pastra la temperaturi mai mari de 25°C.

A se tine separat de mâncare si bauturi.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru vânzare: 48 luni

12. ATENTIONARE (ATENTIONARI) SPECIALA (SPECIALE)

A se evita contactul produsului cu pielea. A se purta manusi. Dupa utilizare se recomanda spalarea mâinilor.

Daca în mod accidental Exspot ajunge la nivel ocular, se recomanda spalarea abundenta cu

apa. Când se foloseste Ex spot, nu se mânca, bea sau fumeaza.

În anumite cazuri, aplicarea prin apasare puternica asociata cu leziuni ale pielii poate duce la aparitia de reactii inflamatorii locale. Daca acestea persista, se recomanda spalarea câinelui cu un sampon.

13. PRECAUTII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deseu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerintele locale.

14. DATE ÎN BAZA CARORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

05.2009

15. ALTE INFORMATII

1 blister x 6 pipete x 1 ml

1 cutie x 12 blistere x 6 pipete x 1 ml.
