



FELOCELL® CVR
 Vaccin viu atenuat contra panleukopeniei, rinotracheitei virale și calicivirozei virale
 feline

COMPOZIȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Fiecare doză (1ml) de Felocell CVR conține următoarele:

Ingredienți activi:

Virus viu atenuat contra panleukopeniei feline
 Tulpina Leopard de zapada

Minimum: 103 CCID50

Virus viu atenuat contra rinotracheitei virale feline (FVR), tulpina FVRm
 Minimum: 105,7 CCID50

Virus viu atenuat contra calicivirozei feline (FCV), tulpina F-9
 Minimum: 106,2 CCID50

2. FORMA FARMACEUTICĂ:

Felocell® CVR este un vaccin constituit dintr-o fracțiune liofilizată ce conține virusurile atenuate - FPL, FVR și FCV și care se reconstituie cu diluant steril.

3. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE

Felocell® CVR este recomandat pentru vaccinarea pisicilor sănătoase și este un ajutor în prevenirea rinotracheitei virale feline (FVR) cauzată de herpes virusul felin panleukopeniei (FPL) produsă de parvovirusul felin (FCV) și a imunității la pisicile sănătoase contra cataractei infecțioase feline (panleukopenie) și a atacurilor respiratorii produse de FVR și calicivirus.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE:

4.1. Speciiile țintă Pisicile

4.2. Indicațiile de utilizare

Felocell® CVR induce imunizarea activă a pisicilor sănătoase împotriva virusului rinotracheitei feline, a calicivirusului și a virusului panleukopeniei.

4.3. Contraindicații

Produsul este eficient în cazul animalelor sănătoase.

Un răspuns imn protectiv poate să nu se producă dacă animalele sunt în perioada de incubare a unei boli infecțioase, sunt malnutrite sau parazitate, sunt stresate ca urmare a transportului sau datorită condițiilor de mediu, sau vaccinul nu este

administrat în concordanță cu indicațiile de pe prospect.

4.4. Efecte indesezirabile Necunoscute

4.5. Precauții speciale de utilizare

Pentru administrarea vaccinului trebuie utilizate ace și seringi sterile.
 Nu se va steriliza locul de administrare cu substanțe chimice deoarece urmele rămase pot inactiva vaccinul.

4.6. Utilizarea în cursul gestației și lactației
 Vaccinarea pisicilor gestante este bine să fie evitată.

4.7. Interacțiuni cu alte medicamente sau alte forme de interacțiuni
 Felocell® CVR nu interferează cu producerea de anticorpi ca răspuns la vaccinare cu unul din următoarele vaccinuri: contra leucemiei feline, a peritoniei infecțioase și contra *Chlamydiae psittaci*. Dinpovriva, nici unul dintre aceste antigene nu interferează cu imnogenitatea lui Felocell® CVR.

4.8. Posologie și metoda de administrare

- Indicații generale:

Este recomandată vaccinarea pisicilor sănătoase. Se va rehidrata, în mod aseptice, vaccinul liofilizat cu diluantul steril aflat în dotare, se va agita bine și se va administra 1ml intramuscular sau subcutanat.

- Prima vaccinare:

Pisicile sănatoase în vârstă de 12 săptămâni trebuie să fie vaccinate de 2 ori la interval de 3-4 săptămâni. Pisicile vaccinate mai devreme de a avea vârsta de 12 săptămâni vor fi revaccinate când vor împlini această vârstă.

- Revaccinarea

Este recomandată revaccinarea anuală cu o singură doză.

4.9. Supradozarea

Investigațiile efectuate privind efectele administrării unei supra-doze de Felocell® CVR confirmă siguranța în această situație.

4.10. Indicații speciale (pentru fiecare specie țintă)

La fel ca și alte vaccinuri, reacțiile anaflactice pot apare în momentul utilizării lui. Antidotelul inițial este epinefrina care trebuie să fie urmată de terapie de susținere corepunzătoare.

4.11. Precauții speciale pentru persoanele ce administrează produsul:
 Nu sunt

5. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE:

5.1. **Incompatibilități**
Nu sunt.

6.2. **Perioada de valabilitate**
18 luni

Se va utiliza întregul conținut în momentul în care flaconul este deschis.

6.3. **Precauții speciale de depozitare**
Vaccinul va fi depozitat între 2°C și 7° C. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate sau/și în bătaia soarelui poate avea efecte adverse asupra eficienței vaccinului. Nu se va congela.

6.4. **Prezentare**
Căți conținând 25 de flacoane de o doză împreună cu flaconele ce conțin diluantul steril.