

târziu cu o lună înainte de naștere.

Notă: Având în vedere imunitatea colostrală, în cazul mănșilor născuți de la iepe demonstrabil vaccinate înainte de naștere, se recomandă ca acești mănși să fie vaccinați la vârsta de 6 luni.

INSTRUCȚIUNE PENTRU O ADMINISTRARE CORECTĂ: A se agita înainte de întrebuițare. A se vaccina numai animalele sănătoase.

Nu sunt informații referitoare la siguranța și eficiența acestui vaccin în cazul în care este administrat simultan cu alte produse medicamentoase veterinare. Decizia de a întrebuița acest vaccin, înainte sau după orice alte produse medicamentoase veterinare, trebuie să se facă în baza aprecierii fiecărui caz.

Se poate întrebuița în decursul gestației și lactației. A nu se amesteca cu nici un alt vaccin sau preparat imunologic.

TEMP DE AȘTEPTARE: Fără perioadă de așteptare.

MĂSURI SPECIALE: A se vaccina numai animalele sănătoase. În caz de auto-injecție accidentală cu preparatul medicamentos, să se apeleze imediat la medic și să i se prezinte acestuia broșura informativă sau eticheta.

VALABILITATE: 36 luni, 10 ore după prima deschidere a flaconului.

PREZENTARE:

Flacone: 2 x 1 doză, 10 x 1 doză

Seringi pre-umplute: 2 x 1 doză.

MĂSURI SPECIALE DE PĂSTRARE: A nu se păstra la îndemâna copiilor. A se păstra în frigider (2°C – 8°C). Durata de întrebuițare după prima deschidere, în cazul mai multor doze: 10 ore.

Nou în România!



BOVIBIO RESPI 4

Vaccin polivalent pentru imunizarea activă a bovinelor împotriva virusului parainfluenza-3, virusului sinșial respirator bovin, virusului diareei bovine și Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

FLUEQUIN T inj. ad us. vet.

Vaccin inactivat împotriva gripei și tetanosului la cabaline

- vaccin foarte eficient pentru vaccinarea preventivă a calilor împotriva gripei și tetanosului începând cu vârsta de 3 luni
- vaccinul conține 3 serovarante ale gripei (tip european și american) și toxoidă tetanică purificată
- se aplică adânc intramuscular în doză de 1 ml
- imunitate solidă se inițiază la 14 până la 21 de zile după revaccinare
- durata imunității este împotriva gripei 6 luni după vaccinarea de bază și împotriva tetanosului 12 luni după vaccinarea de bază



COMPOZIȚIE – 1 ml:

Substanțe curative:

Virus influentis A/Equi 1/Prha 56 inactivat, min. 160 HAU

Virus influentis A/Equi 2/Morava 95 inactivat (tip european), min. 320 HAU

Virus influentis A/Equi 2/Bmo 97 inactivat (tip american), min. 320 HAU

Anatoxinum tetanicum purificat, min. 150 IU

Substanțe ajutoare:

Adjuvant: Hidroxid de aluminiu hidratat pentru absorbție 0,2 ml

Excipiens: Thiomersal 0,1 mg. Soluție fiziologică tampon fosfat ad 1 ml

FORMA FARMACEUTICĂ: Soluție injectabilă.

INDICAȚII: Vaccinarea preventivă a calilor împotriva gripei și tetanosului. Inițierea imunității: O imunitate solidă se inițiază la 14 până la 21 de zile după revaccinare.

Durata imunității: Împotriva gripei, 6 luni după vaccinarea de bază; împotriva tetanosului, 12 luni după vaccinarea de bază

CONTRAINDICAȚII: A nu se administra animalelor care prezintă simptome de boală.

EFFECTE SECUNDARE: Nu sunt cunoscute.

DOZAREA PENTRU FIECARE SPECIE, CALEA ȘI MODUL DE ADMINISTRARE: 1 ml, adânc intramuscular.

Vaccinare de bază:

Prima injecție la vârsta de 3 până la 6 luni, a doua injecție după 4 până la 6 săptămâni.

Revaccinare:

Prima revaccinare (a treia doză) se administrează împotriva gripei la 6 luni după vaccinarea de bază, iar împotriva tetanosului la 12 luni.

O altă revaccinare împotriva gripei se efectuează la fiecare 6-12 luni, în funcție de situația infecțioasă, iar împotriva tetanosului la 12 luni.

Revaccinarea ieșilor gestante se efectuează în ultimul trimestru de graviditate, cel mai