

Compozitie:

Intrafer 200-B12 inj

Fiecare mililitru contine:

Fier (sub forma de fier dextran)..... 200 mg

Vitamina B 12 (cianocobalamina) 200 mcg.

Solventi q s ad.....1 ml.

Actiune farmacoterapeutica: Fierul dextran este folosit pentru profilaxia si tratamentul deficientelor de fier ce cauzeaza anemia la purcei si vitei. Administrarea parenterala a fierului are avantajul ca poate fi administrata într-o singura doza cantitatea de fier necesara. Cianocobalamina este folosita pentru profilaxia si tratamentul deficitului de vitamina B12 ce cauzeaza anemia.

Mod de administrare si dozare:

Pentru administrarea intramusculara sau subcutanata :

Purcei: 1 ml im., 3 zile dupa fatare.

Vitei: 2-4 ml sc., în prima saptamâna dupa fatare.

Contraindicatii :

Administrarea la animale cu deficit de vitamina E Administrarea la animale cu diaree.

Administrarea în combinatie cu tetracidinele, datorita interactiunii fierului cu tetracidinele.

Reactii adverse:

Tesutul muscular este colorat temporal prin acest preparat.

Scurgerea fluidului injectabil poate cauza o decolorare persistenta a pielii.

Interactiuni cu alte medicamente: Nu exista Valabilitate: 2 ani.

Conditii de pastrare :

A nu se pastra la temperaturi peste 25 °C Ambalare: Flacon 100 ml

Specie: purcei, vitei