

Fiecare mililitru conține:

Ivermectină	10 mg
Excipient q.s.ad	1 ml

INDICAȚII:

Bovine și Ovine: Hipodermoză, Nematode gastrointestinale și pulmonare, Ectoparațiți (inclusiv scabie) cauzate de următorii paraziți:

Viermi intestinali: *Ostertagia*, *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Pectinata*, *Oesophagostomum*, *Cooperia*, *C. punctata*, *Nematodirus*, *Bunostomum*, *Strongyloides*, *Toxocara*.

Viermi pulmonari: *Dictyocaulus*, *Protostrongylus*, *Metastrongylus*.

Altele: *Dermatobia*, *Hypoderma*, *Psoroptes*, *Sarcoptes*, *Linognathus*, *Haematopinus*, *Oestrus*, *Haematopinus*.

Porc: Nematode gastrointestinale și pulmonare, Ectoparațiți (inclusiv scabie).

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZARE:

Porc: 0,3 ml/10 kg G vie, subcutanat, în doză unică.

Bovine, Ovine: 0,2 ml/10 kg G vie, subcutanat, în doză unică.

CONTRAINDICAȚII:

Nu s-au semnalat.

EFECTE SECUNDARE:

Pot apare reacții locale la locul administrării.

PRECAUȚII:

Nu este cazul.

SUPRADOZARE:

În caz de supradozare simptomele sunt reprezentate de neliniște, convulsii, comă.

În caz de apariție a acestor simptome se aplică tratament simptomatic.

TIMP DE AȘTEPTARE:

A nu se administra la animalele în lactație sau ce urmează să fete în următoarele 28 de zile.

Carne: 30 de zile.

AMBALARE:

Flacon de 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml și 1000 ml.

PERIOADĂ DE VALABILITATE:

2 ani după data manufacturării.

Însoțiți orice reclamație cu numărul seriei înscrise pe eticheta produsului.

Specie: bovine, ovine, suine