

**COMPOZIȚIE**

1 ml de soluție conține:

Lincomicina (sub formă clorhidrat) 50 mg

Spectinomicina (sub formă sulfat) 100 mg

Excipient până la 1 ml

ACTIONE FARMACOTERAPEUTICĂ

Lincomicina este antibiotic lincosamidic bacteriostatic cu spectru îngust, activ împotriva bacteriilor Gram-pozitive, anaerobe și a micoplasmelor.

Spectinomicina are acțiune bactericidă asupra germenilor Gram-negativi, micoplasmelor și asupra unor germeni Gram-pozitivi.

Combinația acestor antibiotice determină un spectru antimicrobian larg, cu concentrații tisulare, sanguine și urinare ridicate.

INDICAȚII

- Porci: pneumonie, dizenterie, enterite bacteriene, artrite și complicații bacteriene ale afecțiunilor virale.
- Păsări (găini, curci, porumbei, păsări de vânat): boli respiratorii, holeră, infecții stafilococice, sinuzita și ooză păsărilor;
- Viței sugari: pneumonii bacteriene și enterite;
- Oi, capre: infecții respiratorii, afecțiuni podale;
- Câini, pisici: infecții respiratorii, dermatite, infecții urinare și toate infecțiile secundare bacteriene.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Injectii intramusculare sau subcutanate (păsări).

• Porci: 1 ml/10 kg la fiecare 24 de ore, 3-4 zile.

• Vaci: 1 ml/10 kg de 2 ori în prima zi, urmată de o administrare zilnică, 2-4 zile.

• Oi, capre: 1 ml/10 kg zilnic, timp de 3 zile.

• Câini, pisici: 1 ml/5 kg la fiecare 12-24 de ore, maxim 21 de zile.

• Păsări: 0,5 ml/2,5 kg zilnic, 3 zile consecutiv.

PRECAUȚII

Nu se va administra la animale alergice, la cai, iepuri și viței.

Ocazional poate apărea diareea la oi, capre și porci.

CONTRAINDICAȚII

Animale alergice la antibiotic.

Nu se administrează la iepuri, oobai și cai.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne - 14 zile după ultima administrare.

Lapte - 48 ore.

CONSERVARE

La temperatura de 8 - 15°C, ferit de lumină.

AMBALAJ

Flacoane cu 100 ml produs.

PRODUCĂTOR: PHARMACIA & UPJOHN - Belgia.