

Metricure

Metricure, 500 mg/seringa, suspensie intrauterina pentru bovine

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Metricure, 500 mg/seringa, suspensie intrauterina pentru bovine
Cefapirin

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Fiecare seringă de 19 g conține:

Cefapirin 500 mg
(sub forma de Cefapirin benzatin)

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Metricure este indicat pentru tratamentul endometritelor subacute și cronice la vaci (care pot fi prezente după 14 zile de la parturiție) produse de bacterii sensibile la cefapirin.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animalele cunoscute ca fiind alergice la cefalosporine sau peniciline.

6. REACȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Vaci

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Continutul unei seringi de Metricure, va fi introdus în lumenul uterin utilizând cateterul de unica folosință ce

însoteste produsul după cum urmează:

1. se agită seringă înainte de administrare
2. se fixează seringă la cateter.
3. se introduce o mână cu manșă prin rect și se ține cervixul uterin.
4. se introduce cateterul prin cervix în lumenul uterin prin mișcări blande și oscilante
5. se injectează produsul Metricure.

În funcție de răspuns, dacă persistă semnele clinice, este necesară în unele cazuri repetarea tratamentului după 7-14 zile. La animalele care au fost inseminate, Metricure poate fi utilizat după o zi de la inseminare. În cazul piometruului se recomandă ca tratamentul să înceapă cu injectarea unei prostaglandine pentru a se provoca luteoliza și eliminarea detritusurilor din cavitatea uterină, urmată de administrarea de Metricure..

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de administrare, se agită bine seringă și se fixează la cateter.
Introducerea cateterului prin cervix în lumenul uterin se face prin mișcări blande și oscilante.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne: 24 ore
Lapte: Zero ore

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C .
Seringile cu Metricure sunt utilizate numai pentru o singură administrare.
A se păstra seringă în ambalajul secundar.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testul de susceptibilitate al bacteriilor izolate de la animale.
Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul se va baza pe informațiile epidemiologice locale.
Nu se administrează la animalele cunoscute ca fiind alergice la cefalosporine sau peniciline.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În cazul contactului accidental cu pielea, se va spăla imediat zona cu apă și săpun.
Penicilinele și cefalosporinele pot produce reacții de hipersensibilitate (alergice) în urma injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la penicilină poate duce la reacții încrucișate la cefalosporine și invers.
Reacțiile alergice la aceste produse pot fi ocazional serioase.

1. Nu manevrați produsul dacă știți că sunteți alergici sau dacă ați fost sfătuiți să nu lucrați cu astfel de preparate.
 2. Manevrați produsul cu grijă pentru a evita expunerea, luând toate precauțiile necesare.
 3. Dacă prezentați simptome în urma expunerii, cum ar fi iritații ale pielii, ar trebui să cereți sfatul medicului și să prezentați medicului aceste precauții.
- Inflamarea feței, buzelor, ochilor sau dificultăți de respirație sunt simptome mai grave care necesită asistență medicală urgentă.
Spălați mâinile după utilizare.

Nu este recomandată utilizarea produsului în perioada de gestație dar poate fi administrat în timpul perioadei de lactație

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Proprietăți farmacodinamice

Cefapirin este o cefalosporina de prima generație cu spectru larg, cu acțiune bactericidă împotriva bacteriilor Gram pozitive și Gram negative. Cefapirin este rezistent la acțiunea penicilinazei.

Particularități farmacocinetice

După tratamentul intrauterin absorbția sistemică este redusă, fapt demonstrat de nivelele plasmatice reduse de cefapirin observate la scurt timp după tratament. La 12 ore de la tratament nivelul plasmatic de cefapirin era sub nivelul de detecție.

După administrarea intrauterină de Metricure, s-au observat concentrații mari de cefapirin la nivelul endometrului.

S-au observat concentrații terapeutice de Cefapirin în endometru până la 24 de ore.

Seringi din polietilena de înaltă densitate cu piston din polietilena de joasă densitate, cu capac, ce conțin 19 g suspensie, ambalate în cutii de carton cu câte 10 seringi însoțite de 10 catetere pentru administrare intrauterină și 10 manșuri în fiecare cutie.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet Romania SRL

Soseaua de Centura , nr.27 – 28

Comuna Chiajna, jud. Ilfov
