

Mibazon

Compoziție:

100 g unguent conține: tetraciclină 2,50 g, eritromicină 1,20 g, sulfat de neomicină 1,20 g, prednisolon 0,06 g, și excipienți: parafină solidă, stearat de aluminiu, parafină lichidă.

Indicații:

Tetraciclină este un antibiotic cu efect bacteriostatic față de bacteriile Gram-pozitive și Gram-negativ. Tetraciclină acționează bacteriostatic, inhibând sinteza proteinelor bacteriene prin legarea reversibilă de subunitatea ribozomală 30S a bacteriilor.

Eritromicina este un antibiotic din grupa macrolidelor cu efect bacteriostatic față de bacterii Gram-pozitive (*Staphylococcus*, *Streptococcus* sp.), *Mycoplasma* sp., *Rickettsia* sp. Eritromicina acționează bacteriostatic, inhibând sinteza proteinelor bacteriene prin legarea reversibilă de subunitatea ribozomală 50S a bacteriilor.

Neomicina este un antibiotic aminoiglicozidic cu efect bactericid față de bacterii Gram-negativ (*Escherichia coli*, *Brucella abortus*) și bacterii Gram pozitive (*Streptococcus* spp). Neomicina se fixează ireversibil pe subunitatea ribozomală 30S producând inhibarea sintezei proteinei bacteriene și moartea celulară.

Prednisolonul, delta-1-hidrocortizon, are acțiune antiinflamatorie, limfolică și de stimulare a glicogenezei hepatice. Prednisolonul se utilizează ca antiinflamator și antialergic.

Prin intermediul celor 3 antibiotice pe care le conține, Mibazon este activ față de bacterii Gram-pozitive și Gram-negativ, *Mycoplasma* sp., *Rickettsia* sp., implicat în infecții cutanate, infecții oculare și ale glandei mamare. Mibazon este indicat în tratamentul unor afecțiuni ale pielii (abcese, fistule, plăgi), cheratite, blefarite, conjunctivite și mastite produse de bacterii Gram-pozitive și Gram-negativ sensibile la tetraciclină, eritromicină și neomicină la bovine, câini și pisici. Prednisolonul acționează ca antiinflamator și favorizează patrunderea celor trei antibiotice în țesuturile afectate.

Contraindicații:

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la antibioticele din compoziția produsului.

Reacții adverse:

Nu se cunosc. Dacă observați reacții adverse sau alte efecte nedorite adresați-vă medicului veterinar.

Specii țintă:

Bovine, câini, pisici

Administrare și dozaj:

Tratamentul afecțiunilor pielii la bovine, câini și pisici: pe zona afectată, curată și dezinfectată în prealabil se aplică un strat subțire și continuu de Mibazon de 2-3 ori/zi, în funcție de gravitatea cazului, până la vindecare.

Tratamentul infecțiilor oculare la bovine, câini și pisici: se introduce unguentul în sacul conjunctival de 1-3 ori/zi, în funcție de gravitatea cazului, până la vindecare

Tratamentul mastitelor la vaci: se introduce 1/6 din conținutul tubului de unguent, cu ajutorul alonjii, prin canalul galactofor, în compartimentele afectate, care în prealabil au fost mulsă și curățate cu o soluție dezinfectantă. Se masează ugerul și nu se mulge timp de 24 ore, după care se repetă tratamentul, folosindu-se la tubul cu unguent o nouă alonjă.

Recomandări privind administrarea corectă:

Pentru reușita tratamentului mastitelor la vaci trebuie procedat astfel: se izolează animalele bolnave de cele sănătoase și se iau măsuri de igienă

Se dezinfectează ugerul animalului bolnav și mâinile mulgătorului înainte de muls

Se ține tubul în apă caldă, 35-40°C, înainte de întrebuintare, pentru o mai ușoară introducere a medicamentului

Alonjă se sterilizează prin fierbere

Sferturile afectate se vor mulge obligatoriu după mulgerea sferturilor sănatoase, iar laptele se va colecta separat și nu se va utiliza în alimentația omului sau hrana animalelor.

Se adaptează alonjă din polietilenă la tubul cu medicament.

Prin manipulare ușoară, pentru a evita rănirea mucoasei, se introduce alonjă prin orificiul mamelonului și se presează tubul până ce 1/6 din conținutul acestuia este depus cât mai spre bază.

Se retrage alonjă și se introduce într-un vas cu dezinfectant după care se distruge.

Se masează ușor ugerul după introducerea medicamentului

Dacă tratamentul s-a aplicat precoce sunt suficiente, de regulă 2 administrări de Mibazon pentru vindecare. La mastite pe cale de cronicizare se recomandă continuarea tratamentului timp de 3-4 zile. În cazuri mai grave se recomandă asocierea cu tratamente cu antibiotice sau sulfamide pe cale generală.

Perioada de așteptare:

Carne-28 zile, lapte-7 zile de la ultima administrare

Contraindicații și precauții:

Nu se administrează la animale alergice la antibioticele din componenta medicamentului.

Precauții speciale pentru depozitare:

A nu se lăsa la îndemână și vederea copiilor

A se păstra la temperaturi sub 25°C

A se păstra în ambalajul original

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj

Atenționări speciale: nu sunt.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz:

Medicamentele nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere sau apele reziduale. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Mod de prezentare:

tub cu 36 g unguent tip suspensie și 6 alonje din polietilenă

Termen de valabilitate:

2 ani, păstrat în ambalaj original

Producător: