

Nobilis RT+IBmulti+G+ND

Nobilis RT+IBmulti+G +ND, vaccin inactivat pentru găini de reproducție

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

MSD Animal Health
Vim de Korverstraat 35
5831 AN Boxtmeer
Olanda

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis RT+IBmulti+G +ND, vaccin inactivat pentru găini de reproducție

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Pe o doză de 0,5 ml

Virusul bronșitei infecțioase, tulpina M41 (Massachusetts): induce $\geq 5.5 \log_2$ unități VN

Virusul bronșitei infecțioase, tulpina 249g (D274/D207): induce $\geq 4.0 \log_2$ unități VN

Virusul rinotraheitei infecțioase, tulpina But 1#8544 (subgrupă A): induce $\geq 9,5 \log_2$ unități ELISA

Virusul bursitei infecțioase, tulpina D78: induce $\geq 14.5 \log_2$ unități VN

Virusul bolii Newcastle, tulpina Clone 30: induce $\geq 4.0 \log_2$ unități HI pe doză 1/50

sau conține ≥ 50 unități PD_{50}

Parafina lichida

Polisorbat 80

Oleat sorbitan

Glicina

Apa pentru injectare

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Imunizare activă a găinilor de reproducție pentru:

- reducerea infecției și prevenirea scăderii producției de oua cauzate de virusul bronșitei infecțioase, serotipul Massachusetts

- reducerea scăderii producției de oua sau a tulburărilor de ouat manifestate prin apariția ouălelor cu defecte ale cojii cauzate de virusul bronșitei infecțioase, serotipul D274/D207

- reducerea infecțiozității cauzate de virusul bolii Newcastle

- prevenirea semnelor respiratorii și reducerea scăderii producției de oua sau a tulburărilor de ouat manifestate prin apariția ouălelor cu defecte ale cojii cauzate de virusul Rinotraheitei aviare

- imunizarea pasivă a progenitorilor pasărilor vaccinate împotriva bolii bursitei infecțioase pentru cel puțin primele patru săptămâni de viață.

Găinile dezvoltă imunitate după 4 săptămâni de la vaccinare și durează cel puțin o perioadă de ouat.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

6. REACȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

La locul inoculării poate să apară o ușoară inflamație trecătoare.

7. SPECII ȚINTĂ

Găini de reproducție

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Nobilis RT+IBmulti+G+ND se administrează în jurul vârstei de 14-20 săptămâni, dar nu mai târziu de 4 săptămâni înainte de perioada estimată începerii ouatului. În orice caz, pasărilor la care s-au utilizat înainte vaccinuri vii împotriva bronșitei infecțioase, rinotraheitei, bolii Newcastle și bursitei infecțioase, vaccinul Nobilis RT+IBmulti+G+ND trebuie administrat la cel puțin 4 săptămâni după administrarea vaccinurilor vii.

Fiecare pasăre se vaccinează intramuscular (în piept sau în picior) sau subcutanat (pe fața dorsală a gâtului) cu 0,5 ml vaccin.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se vor vaccina numai pasările sănătoase.

Înainte de folosi vaccinul, acesta trebuie adus la temperatura camerei (15-25°C).

Agitați bine flaconul înainte de folosire și periodic în timpul folosirii. Asigurați-vă că echipamentul pentru vaccinare este curat și steril înainte de folosire.

Nu folosiți echipament pentru vaccinare cu părți de cauciuc pentru ca excipientul poate deteriora cauciucul.

Folosiți întregul conținut pe parcursul a 3 ore.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C).

A nu se refrigera.

A se proteja de lumină.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 de luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului: 3 ore.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

În caz de auto-injecție accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta și menționați că v-ați auto-injectat cu emulsie vaccinală apă în ulei.

Auto-injecția accidentală cu acest adjuvant uleios poate cauza dureri puternice și inflamații ce pot duce la pierderea degetului. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată și spălarea zonei injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie

eliminate în conformitate cu cerințele locale

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

ZZ/LL/AAAA

15. ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat al producătorului sau al distribuitorului autorizat de comercializare.