

Nobivac® DHP



VACCIN CONTRA JIGODIEI, HEPATITEI
INFECȚIOASE ȘI PARVOVIRZEI LA CÂINE

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR



DESCRIERE

Nobivac® DHP se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă liofilizată.

COMPOZIȚIE

Nobivac® DHP este un vaccin combinat, liofilizat, constând din tulpini vii, atenuate. Fiecare doză conține minimum 10^3 TCID₅₀ (= doză infectantă 50 pentru culturi de țesuturi) virus al jigodiei canine (CDV tulpina Onderstepoort), minimum 10^3 TCID₅₀ adenovirus canin tip 2 (CAV₂ tulpina Manhattan) și minimum 10^7 TCID₅₀ parvovirus canin (CPV tulpina Intervet 154). Vaccinul mai conține stabilizator și cantități mici de antibiotice.

MOD DE ACȚIUNE

Nobivac® DHP induce o imunitate activă, solidă, contra jigodiei, hepatitei infecțioase și parvovirozei la câine.

INDICAȚII

Pentru imunizarea câinilor contra jigodiei canine (CDV), hepatitei infecțioase canine cauzată de adenovirusul canin tip 2 (CAV₂) și parvovirozei canine (CPV).

CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează câinii bolnavi.

EFECTE ADVERSE

După vaccinare, uneori, poate apărea o ușoară reacție de hipersensibilitate; în acest caz se administrează adrenalină.

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Fiecare animal se vaccinează subcutanat cu 1 ml (1 doză). Vaccinul se poate reconstitui cu Nobivac® Diluant, Nobivac® L, Nobivac® Rabies sau Nobivac® RL.

Program de vaccinare

Pentru asigurarea protecției se vor efectua vaccinări succesive la interval de 2-3 săptămâni, conform situațiilor de mai jos:

A). Dacă prima vaccinare se face la vârsta de 4-6 săptămâni și statusul MDA (anticorpi derivați de la mamă) este necunoscut:

- 4-6 săptămâni: Nobivac® Parvo-C sau Nobivac® Puppy DP
- 8-9 săptămâni: Nobivac® DHP cu Nobivac® L
- 12 săptămâni: Nobivac® DHP cu Nobivac® L, Nobivac® Rabies sau Nobivac® RL

B). Dacă prima vaccinare se face la vârsta de 8-9 săptămâni:

- 8-9 săptămâni - Nobivac® DHP cu Nobivac® L
- 12 săptămâni - Nobivac® DHP cu Nobivac® L, Nobivac® Rabies sau Nobivac® RL

C). Dacă prima vaccinare începe la vârsta de 12 săptămâni:

- 12 săptămâni - Nobivac® DHP cu Nobivac® L, Nobivac® Rabies sau Nobivac® RL
- 14-15 săptămâni - Nobivac® L

Se recomandă revaccinarea anuală.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

INCOMPATIBILITĂȚI ȘI INTERACȚIUNI

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe în afară de vaccinurile din gama Nobivac®.

PRECAUȚII

După vaccinare, contactul cu sursele potențiale de infecție va fi evitat timp de 14 zile. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

SUPRADOZARE

Se va evita supradozarea.

PĂSTRARE

Vaccin liofilizat: la temperatura de 2-8°C (la frigider), la întuneric și ferit de îngheț. Vaccinul reconstituit se folosește în max. 30 de minute. Diluant: la temperatura camerei (15-20°C).

PREZENTARE

Vaccin: cutie cu 10 flacoane x 1 doză.

Diluant: cutie cu 10 flacoane x 1 ml.

PRECAUȚII PENTRU PRODUSUL NEÎNTREBUINȚAT ȘI AMBALAJE

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nr. și dată înregistrare: 84795/18 - 8.12.1998

Nobivac® L (LEPTO)



VACCIN CONTRA LEPTOSPIROZEI LA CÂINE

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR



DESCRIERE

Nobivac® L (Lepto) se prezintă sub forma unui flacon ce conține un lichid incolor.

COMPOZIȚIE

Nobivac® L este un vaccin inactivat, bivalent. Fiecare doză conține cel puțin 40 PD₅₀ (=doze patogene 80 pentru hamster) de *Leptospira interrogans*, serogrupa *canicola*, tulpina Ca-12-000 și cel puțin 40 PD₅₀ pentru hamster de *Leptospira interrogans*, serogrupa *icterohaemorrhagiae*, tulpina 820 K.

MOD DE ACȚIUNE

Nobivac® L (Lepto) asigură o imunitate solidă contra infecției cu cele două serogrupa de *Leptospira*.

INDICAȚII

Pentru imunizarea activă a câinilor contra leptospirozei cauzată de *Leptospira interrogans*, serogrupa *canicola* și *icterohaemorrhagiae*.

CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează câinii bolnavi și animalele gestante.

EFECTE ADVERSE

După vaccinare, uneori, poate apărea o reacție ușoară de hipersensibilitate. În acest caz se administrează adrenalină.

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Fiecare animal se vaccinează subcutanat cu 1 ml vaccin (1 doză). Nobivac® L poate fi utilizat pentru reconstituirea vaccinurilor Nobivac® DHP, DHPi, Puppy DP, Parvo-C.

Program de vaccinare

Prima vaccinare se face începând cu vârsta de 8 săptămâni urmată de rapel 2-3 săptămâni mai târziu.

Se recomandă revaccinarea anuală.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

PRECAUȚII

Înainte de utilizare vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

SUPRADOZARE

Se va evita supradozarea.

PĂSTRARE

La temperatura de 2-8°C (la frigider), la întuneric și ferit de îngheț.

PREZENTARE

Cutie cu 10 flacoane x 1 doză.

PRECAUȚII PENTRU PRODUSUL NEÎNTREBUINȚAT ȘI AMBALAJE

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nr. și dată înregistrare: 84795/15-08.12.1998