



4. INDICAȚII

Tratamentul durerilor, spasmelor, febrei, în cazuri de colică, obstrucție esofagiană și alte spasme precum și cele specifice organelor abdominale precum și pareze. Afecțiuni reumatice ca artrita acută și cronică, tendovaginita, nevritile și nevralgiile.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Nu folosiți în caz de ulcerări ale mucoasei gastrointestinale și insuficiența hepatică, cardiacă sau renală.

Administrați la animalele cu dereglări ale hematopoezei numai după o precizie evaluare a riscului și beneficiului.

Nu folosiți la pisici din cauza conținutului de Benzil alcool.

6. REACȚII ADVERSE

Principalele efecte nedorite al Metamizolului se bazează pe reacțiile de hipersensibilitate. Cele mai importante sunt socul și o hemotoxicitate independentă de doza pe baze alergice (agranulocitoză, leucocitopenie și trombocitopenie). Ambele reacții sunt foarte rare în ciuda aplicării pe plan mondial de multe decenii a Metamizolului. În caz de simptome de șoc sau reacții alergice informați imediat medicul veterinar care va acționa corespunzător.

Dacă observați efecte grave sau alte efecte menționate în acest prospect, rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, suine, câini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru injecții intramusculare sau injecții intravenoase lente (numai de medicul veterinar):
Cai 20 - 50 ml (numai intravenos)
Mânji 5 - 15 ml (numai intravenos)
Bovine 20 - 40 ml

Vitei 5 - 10 ml

Porci 10 - 30 ml

Purceli, câini 1 - 3 ml

Dacă este necesar și recomandat de medicul veterinar, injecțiile pot fi repetate în aceeași zi la intervale de minimum opt ore.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu amestecați cu alt produs medical veterinar! Nu administrați subcutanat, deoarece pot apărea iritații ale țesuturilor. Din cauza riscului de șoc administrarea intravenoasă a Metamizolului trebuie făcută lent.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe:

Porc: 3 zile

Bovine: 13 zile

Cai (numai intravenos): 6 zile

Lapte (vac): 2 1/2 zile (5 mulsoni)

A nu se administra ieșelor producătoare de lapte pentru consum uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

După prima deschidere a flaconului nu păstrați la temperatura mai mare de 25 °C.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

În combinație cu neuroleptice (în special derivați ai fenotiazinului) poate apărea o hipotermie severă. Tratamentul simulan cu inductori ai enzimelor microzomale hepatice (barbiturice, fenilbutazonă) scurtează perioada de înjumătățire și prin aceasta durata de acțiune a Metamizolului.

Când sunt administrate ciclosporine simultan, nivelul ciclosporinic poate fi diminuat.

În caz de supradozare masivă pot apărea salivă, vomă, colapsul circulator. În asemenea cazuri rugăm informați medicul veterinar care va acționa corespunzător.

Acest produs medicinal veterinar poate fi utilizat pe durata lactației. Utilizați pe timpul gestației numai dacă s-a cerut de către responsabilul veterinar.

Pentru utilizator:

În caz de autoinjectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

06.06.2011

15. ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

România

Richter Pharma s.r.l.

Calea Șerban Vodă nr. 195

București, Sect. 4, 040206 - RO

Tel: +401 3365428

richterpharma@clicknet.ro

Informații adiționale:

Metamizolul aparține grupului de derivați ai pirazolonului cu puternic efect analgezic, antipiretic și spasmolitic.

Efectul se instalează în aproximativ 30 minute după injecția intramusculară și în 10-15 minute după administrarea intravenoasă.

Acțiunea analgezică centrală duce la o sedare rapidă a animalului.