

Porcilis PARVO

Porcilis® PARVO, vaccin inactivat care contine 8,2 – 12 log₂ HI unitati de PPV per doza in suspensie apoasa

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxtmeer
Olanda

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Porcilis® PARVO, vaccin inactivat care contine 8,2 – 12 log₂ HI unitati de PPV per doza in suspensie apoasa

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Per doza de 2 ml:

Virusului PPV, tulpina 014, inactivat cu BPL, cultivat pe culturi celulare si care induce intre 8,2 – 12 log₂ UIHA, unitati inhibo-hemaglutinante masurate cu ajutorul testului de potența (0,36ml)

Adjuvant (adjuvanți):

α-tocoferol acetat 150 mg

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Vaccinul imunizează activ scroafele și scrofițele în vederea protecției embrionilor și fetoșilor împotriva PPV. Imunitatea de protecție este atinsă atunci cand vaccinarea se realizeaza la 2-8 saptamani inainte de monta si este eficace timp de un an (doua gestatii ulterioare).

5. CONTRAINDICAȚII

Cand vaccinul este utilizat conform instructiunilor, nu sunt contraindicatii.

6. REACȚII ADVERSE

La locul inoculării poate să apară o reacție cu caracter trecător.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Scroafe si scrofițe

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se injectează intramuscular 2 ml de vaccin la nivelul gâtului, în zona din spatele urechii. Scroafitele trebuie vaccinate o singură dată între 8 și 2 săptămâni înainte de prima montă. Scroafele trebuie vaccinate o singură dată cu cel puțin 2 săptămâni înainte de montă. Datorită posibilelor interferențe cu anticorpii derivați maternali, scroafitele nu trebuie vaccinate înainte de vârsta de 6 luni. Revaccinarea ar trebui să se administreze între fiecare două monte. În general, aceasta înseamnă o dată la 5-6 luni.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se vor vaccina numai animalele sănatoase. Înainte de utilizare vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15-25°C). Se vor utiliza seringi și ace sterile. Agitați bine flaconul înainte și cu regularitate în timpul folosirii.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C).

A nu se congela.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 10 ore.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

În caz de auto-injecție accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Flacoane din sticlă hidrolitică de tip II (Ph.Eur.) sau polietilena tereftalat (PET) închise cu dopuri din cauciuc nitril și sigilate cu capac de aluminiu codat, conținând 20 ml (10 doze) sau 50 ml (25 doze) sau 100 ml (50 doze) de vaccin.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.
