

Receptal®

038115 INU740

01

GONADOTROFINĂ - Rh INJECTABILĂ

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

Descriere

Receptal® se prezintă sub forma unui flacon ce conține o soluție limpede de acetat de buserelin.

Compoziție

1 ml conține 0,0042 mg acetat de buserelin.

Mod de acțiune

Acetatul de buserelin este un releasing-hormon identic hormonului natural de eliberare gonadotropilor. Derivatul Receptal® exercită o acțiune identică cu a a Gn-Rh-ului endogen: GnRH controlează producția și secreția hormonului luteinizant (LH) și a hormonului de stimulare foliculară (FSH) de către lobul anterior al hipofizei. Injectarea de Receptal® determină în scurt timp eliberarea simultană de LH și FSH. Atât LH cât și FSH exercită un efect direct asupra ovarului. FSH stimulează dezvoltarea foliculară iar LH induce ovulația și luteinizarea.

Indicații

Tulburări de fertilitate de origine ovariană, îmbunătățirea ratei de fecunditate la vaci, iepi și iepuroaice de casă.

Vacă

Tratamentul chiștilor foliculare: nu este necesară enucleerea chiștilor. La 8 zile de la administrarea Receptal®, chiștii răspund la tratament. Chiștii ajung la dehiscență sau continuă să se luteinizeze până la transformarea în corp galben, reușita tratamentului constatându-se după 10-14 zile. În interval de 20 zile de la tratament animalele revin la estru și pot fi însămânțate artificial sau montate. Pentru îmbunătățirea fecundității se recomandă un tratament suplimentar cu 2,5 ml Receptal®.

Anestru: după 10-12 zile de la tratament se va efectua un control privind apariția estrului. Tratamentul trebuie repetat dacă nu se constată funcționalitatea ovarului și nu este recomandat în situația în care se depistează un corp galben fără manifestarea semnelor exterioare ale estrului.

Întârzierea dehiscenței ovariene și atrezia foliculară: pot fi tratate în momentul montei, respectiv cel al însămânțării artificiale sau înaintea acestui moment cu până la 6 ore. Ovulația se va declanșa în următoarele 24 ore.

Ameliorarea ratei de fecundare: administrarea în momentul însămânțării sau înaintea acestui moment cu până la 6 ore.

Profilaxia tulburărilor de fertilitate: dacă se administrează între a 10-a și a 14-a zi post-partum, după mai puțin de 24 ore se va declanșa ovulația. Tratamentul va duce la reluarea ciclului estral fiziologic și va reduce incidența apariției ovarelor chistice.

Iepă

Tratamentul chiștilor foliculare: un singur tratament este suficient iar dacă după 10-14 zile nu se constată un răspuns favorabil care să se manifeste prin involuția chiștilor și prin fîmîterea stării de estru prelungit sau permanent, tratamentul trebuie repetat.

Inducerea ovulației: trebuie administrat în a 2-a sau în a 3-a zi de estru la iepi cu ciclu de călduri scurt și în a 7-a sau în a 8-a zi de estru la cele cu ciclu lung. Ovulația se va produce după 24-36 ore de la tratament.

Iepuroaică

Ameliorarea ratei de fecundare: în momentul montei sau al însămânțării artificiale.

Ameliorarea fertilității post-partum: imediat după 24 ore de la parturiție.

Contraindicații

Nu se cunosc.

Efecte adverse

Nu se cunosc.

Doze și mod de administrare

Specia	Indicația	Doza
Vacă	Chiști foliculari cu / fără semne de nimformanție	5 ml
	Anestru	5 ml
	Întârzierea dehiscenței foliculare	2,5 ml
	Atrezie foliculară	2,5 ml
	Ameliorarea ratei de fecundare	2,5 ml
Iepă	Ameliorarea fertilității la inducerea timpurii a ciclului	5 ml
	Chiști ovarieni cu/fără prelungirea stării de estru	10 ml
	Anestru, fără manifestarea ciclurilor	2x5 ml - la interval de 24 h
Iepuroaică de casă	Inducerea ovulației	10 ml
	Ameliorarea ratei de fecundare	0,2 ml
	Inducerea ovulației la însămânțarea post-partum	0,2 ml

Se administrează în general pe cale intramusculară dar se poate administra și intravenos sau subcutanat.

Perioada de așteptare

Nu este cazul.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu sunt.

Precauții

Nu se impun.

Păstrare

La temperatura camerei (15-25°C) și la întuneric.

Valabilitate

5 ani de la data fabricației.

Prezentare

Flacon de 10ml.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nr. și dată înregistrare: 040378/ 13.09.2004.

Lot/Data de expirare: vezi ambalaj

Producător-Ambalator:

Intervet International GmbH - Germania

Importator și distribuitor:

Intervet România S.R.L.,
Șoseaua de Centură, nr. 27 - 28, Chiajna, ILFOV
Tel: 021.311.83.11; Fax: 021.311.83.17

intervet