

RILEXINE 500 DC

Suspensie intramamara, in perioada de repaus mamar

Descriere: Rilexine 500 se prezinta sub forma unei seringi, ce contine o suspensie neirritanta pentru administrare intramamara in perioada de repaus mamar

Compozitie: Seringa de 10 ml contine 375 mg cefalexina (benzatin) si excipient.

Mod de actiune: Cefalexina este un antibiotic semi-sintetic β lactam, bactericid, din familia cefalosporinelor. Obtinuta prin semi-sinteza din acidul 7-amino-cefalosporinic, cefalosporina actioneaza prin inhibarea sintezei nucleo-peptidelor peretelui bacterian.

Indicatii: La vacile in repaus mamar, pentru preventie sau tratamentul mastitelor subclinice. Cefalexina este activa impotriva germenilor Gram negativi si Gram pozitivi care se asociaza in producerea mastitelor la vaci, precum: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalctiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*.

Contra indicatii: Nu se administreaza la animalele sensibile la cefalosporine.

Mod de administrare

- Mod de administrare:**
- Inainte de tratament se mulge fiecare sfert
 - Se dezinfecteaza mameloanele
 - Se injecteaza lent si se maseaza mamelonul usor, de jos in sus pentru dispersarea ascendenta a suspensiei
 - Tratamentul se face numai in perioada de repaus mamar cu circa 2 luni inainte de fatare
 - O seringă pentru un sfert, dupa ultimul muls înainte de întarcare

Supradozare: Nu este cazul

Efecte adverse: Nu sunt

Incompatibilitati si interactiuni: Nu se cunosc

Precautii: Persoanele alergice la cefalosporine vor evita contactul cu pielea

Perioada de asteptare: Lapte 65 zile (5 zile dupa fatare); Carne 0 zile

Prezervare: La temperatura camerei si ferite de actiunea razelor solare

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei

Prezentare: Cutii cu 4 seringi a cate 10 ml fiecare.