

Rimadyl Tablete

Compozitie

Tablete 20 mg20 mg Carprofen

Tablete 50 mg50 mg Carprofen

Tablete 100 mg100 mg Carprofen

Actiune terapeutică

RYMADYL este un antiinflamator nesteroidian cu activități antiinflamatorii, analgezice și antipiretice. Face parte din grupul acidului acrilpropionic al substanțelor antiinflamatorii nesteroidiene. Au fost realizate trei tipuri de tablete, de 20 mg, 50 mg și 100 mg pentru a fi folosite la câini, în tratamentul osteoartritelor și al proceselor degenerative articulare și osoase. Carprofen se prezintă sub forma unor tablete albe, cu o renură centrală, destinate pentru administrare orală. Formularea RYMADYL TABLETE este convențională. Produsul a fost conceput astfel încât să aibă o eliberare imediată după administrare, substanța activă fiind foarte rapid absorbită.

Indicatii

Pentru reducerea proceselor inflamatorii și calmarea (usurarea) fenomenelor asociate inflamațiilor (durere) din afecțiunile musculo-scheletale acute și cronice (osteoartrite, artroze, spondilite, spondiloze). RYMADYL poate fi folosit și ca agent antiinflamator și analgezic, în combaterea inflamațiilor post-operatorii și a altor stări de disconfort la câini.

Administrare și dozaj

Se recomandă administrarea unei doze inițiale de 2-4 mg pe kg greutate vie și pe zi divizată în mod egal în 2 reprize. O reducere a dozei la 2 mg pe kg greutate vie și pe zi și care poate fi administrată o singură dată pe zi poate fi instituită după 7 zile de la începerea tratamentului și apariția răspunsului clinic al subiectului. Mai jos este prezentat un tabel cu dozele de întreținere:

Doze de întreținere Tablete per doză

Caine 5 kg ½ tb 20 mg

Caine 10 kg 1 tb 20 mg

Caine 12.5 kg ½ tb 50 mg

Caine 15 kg 1½ tb 20 mg

Caine 20 kg 2 tb 20 mg

Caine 25 kg 1 tb 50 mg sau 0,5 tb 100 mg

Caine 37.5 kg 1½ tb 50 mg -

Caine 50 kg 2 tb 50 mg sau 1 tb 100 mg

Caine 75 kg 3 tb 50 mg sau 1½ tb 100 mg

Caine 100 kg 4 tb 50 mg sau 2 tb 100 mg

Durata tratamentului va depinde de răspunsul observat, dar starea generală a animalului va fi reevaluată la maxim 14 zile de către medicul veterinar.

Contraindicații și precauții

Nu se va depăși doza recomandată sau durata tratamentului. La fel ca și în cazul altor inflamatorii nesteroidice poate apărea o iritație gastrică în timpul administrării. Totuși, datele clinice și experimentale sugerează că aceste efecte sunt rar produse de către Carprofen la câini și apar numai atunci când doza depășește cu mult doza terapeutică.

În absența studiilor asupra efectelor medicamentului la cățelele gestante, utilizarea acestuia nu este indicată la această categorie. Instituirea unei terapii concurente cu alte medicamente nesteroidice sau cu medicamente cu efect nefrototoxic fără o perioadă de așteptare de 24 de ore între tratamente este contraindicată. La fel ca în cazul tuturor anti-inflamatoriilor nesteroidice trebuie avută grija în cazul animalelor cu antecedente de boli cardiace, renale sau hepatice.

Pastrare

Se va păstra la loc răcoros și uscat.

Reprezentantul producătorului: Pfizer Animal Health, Reprezentanta pentru România, Splaiul Independenței 179, Sector 5, București