

Fiecare tableta Synulox 50 mg conține:

40 mg Amoxicilina + 10 mg Acid clavulanic

- Rezistența la multe antibiotice este produsă de beta-lactamaze, enzime ce inactivează antibioticul înainte ca el să poată acționa asupra bacteriilor.
- Acidul clavulanic din SYNULOX neutralizează acest mecanism de apărare al bacteriilor inactivând beta-lactamaza, iar microorganismele devin sensibile la efectul bactericid rapid al amoxicilinei, în concentrații ușor de atins în organism.

Acționează față de o gamă largă de bacterii, ca:

- Staphylococcus spp. (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze);
- Escherichia coli (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze);
- Salmonella spp. (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze);
- Pasteurella spp. (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze);
- Bacteroides (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze);
- Haemophilus spp.;
- Bordetella bronchiseptica;
- Campylobacter spp.;
- Klebsiella;
- Proteus spp.;
- Streptococi;
- Corynebacterium spp.;
- Clostridium spp.;
- Fusobacterium necrophorum.

Indicații

Din punct de vedere clinic, Synulox 50 mg a fost indicat ca fiind eficient în tratarea unei game largi de boli la câini și pisici, ca:

- boli de piele (în piodermite profunde și superficiale);
- infecții genito-urinare;
- boli respiratorii (infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare);
- enterite;
- infecții ale cavității bucale;
- infecții ale țesuturilor moi;
- infecții osteo-articulare.

Administrare și dozaj

Administrarea se face pe cale orală.

Doza 12,5 mg / kg greutate corporală.

Frecvența dozării – după următorul model:

- 1 - 3 kg, ½ tableta Synulox 50 mg
- 3 - 5 kg, 1 tableta Synulox 50 mg
- 6 - 9 kg, 2 tablete Synulox 50 mg
- 10 - 13 kg, 3 tablete Synulox 50 mg
- 14 - 18 kg, 4 tablete Synulox 50 mg
- 19 - 25 kg, 1 tableta Synulox 250 mg
- 26 - 35 kg, 2 tablete Synulox 250 mg
- 36 - 49 kg, 2 tablete Synulox 250 mg
- 50 kg, 3 tablete Synulox 250 mg

În cazurile refractare, mai ales de infecții ale căilor respiratorii, se dublează doza la 25 mg / kg greutate vie, de 2 ori pe zi.

Durata terapiei:

- cazurile de rutină în toate bolile indicate - terapie 5-7 zile;
- cazurile cronice sau refractare - sunt sugerate următoarele durate de tratament:
- boli de piele cronice - 10-20 zile
- cistite cronice - 10-28 zile
- boli respiratorii - 8-10 zile

Contraindicații, precauții:

- Nu se administrează la iepuri, cobai și hamsteri.
- A se folosi cu precauție la orice alt erbivor mic.

Conservare:

- Se va păstra într-un loc răcoros și uscat.