

Taktic

Concentrat emulsifiabil pentru suine, bovine, ovine și caprine.

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

Producător:
Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
F – 27460 Igoville
Franța

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Taktic 12.5% amitraz

Concentrat emulsifiabil de uz extern împotriva ectoparaziților la bovine, suine, ovine și caprine.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTII)

Substanță activă:

Amitraz 125mg/ml

Excipienți:

Solvesso 200

Nonoxinol 9

Tetraizopropildifenilcarbodiimidă

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Porcine: tratamentul și controlul infestației cu râie sarcoptică și păduchi

Bovine: tratamentul și controlul infestației cu căpușe, râie și păduchi

Ovine și caprine: tratamentul și controlul infestației cu căpușe, râie, păduchi și *Melophagus ovinus*

5. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt

6. REACȚII ADVERSE

Nu sunt, dacă se respectă dozele recomandate.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Porcine, bovine, ovine și caprine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Sub formă de spray la porcine și bovine, prin îmbăiere sau sub formă de spray la ovine și caprine.

Porci:

Amestecați în proporție de 40 ml Taktic la fiecare 10 litri de apă. Preparați spray-ul în ziua tratamentului, folosind apă curată. Îndepărtați mâncarea din boxă și acoperiți adăpătorile. Îndepărtați așternutul și curățați boxele. Tratați toate animalele dintr-un grup, simultan, fie că sunt afectate vizibil sau nu. Utilizați suficientă soluție pentru a uda animalele pe tot corpul, acordând atenție deosebită urechilor, zonei ventrale și zonei dintre picioarele anterioare. Se îndală crustele înainte de tratament.

PROGRAMUL DE CONTROL RECOMANDAT

Se tratează inițial, cu Taktic, tot efectivul. Se repetă tratamentul după 7-10 zile. Efectuați tratamente profilactice de rutină după cum urmează:

Vieri activi: A se trata la fiecare 2-3 luni.

Scroafe și scrofițe: A se trata la intrarea în compartimentele de fătare.

Tineret: A se trata după înțarcare sau înainte de mutarea în halele de îngrășătorie.

Noii veniți în efectiv: Vor fi izolați și vor fi tratați înainte de a fi introduși în efectiv.

Clădiri: Pentru a dezinfecta clădirile goale, se poate folosi un singur tratament cu 80 ml Taktic în 10 litri apă

Bovine:

Se amestecă în proporție de 20 ml Taktic la fiecare 10 litri de apă. Soluția pentru spray se prepară în ziua tratamentului, folosind apă curată. Pulverizați 5-10 litri soluție pe fiecare animal, funcție de greutatea acestuia. Pulverizați soluția pe întreg corpul animalului până când acesta este complet ud. În cazuri severe de râie sau infestație cu păduchi, repetați tratamentul după 7-10 zile. Repetați programul la fiecare 2-3 luni pentru ca efectivul să nu se reinfesteze cu păduchi sau râie. Tratați toate animalele dintr-un grup fie că sunt afectate vizibil sau nu. Pentru controlul infestației cu căpușe bovinele ar trebui tratate la fiecare 9-10 zile, pe durata perioadei de risc.

Ovine și caprine:

Toate oile expuse infestării cu căpușe, păduchi, *Melophagus ovinus* sau râie, inclusiv râia sarcoptică, trebuie tratate. Tratamentul se va repeta după 14 zile, dacă apar simptome de reinfestare. Taktic nu are un miros puternic și nu cauzează nerecunoașterea mamă – miel.

Un singur tratament distruge căpușele și previne reinfestarea timp de până la 6 săptămâni.

CONCENTRAȚIA INIȚIALĂ: Se amestecă în proporție de 1 litru Taktic la fiecare 250 litri apă, pentru a obține o soluție 0,05%.

REUMPLEREA: Se amestecă în proporție de 1.5 litri Taktic la fiecare 250 litri apă. Se va reumple înainte ca volumul soluției să scadă cu 10%.

METODA: Se prepară soluția pentru îmbăiere, în ziua tratamentului. Se umple bazinul cu apă curată. Se adaugă volumul necesar de Taktic, direct în apă, și se amestecă bine. După utilizare se elimină soluția folosită.

CÂND SE ÎMBĂIAZĂ: Oile și caprele adulte vor fi îmbăiate imediat înainte de momentul preconizat de apariția a căpușelor. Tineretul ovin și caprin se îmbăiază înainte de a ieși pe pășuni infestate cu căpușe. Mielii și iezii pot fi îmbăiați în siguranță de la vârsta de 3-4 zile și vor trebui re-îmbăiați după 3-4 săptămâni deoarece lâna lor cu fir scurt nu va menține o cantitate suficientă de soluție pentru a asigura protecție de lungă durată. Se va permite oilor și caprelor să se odihnească și vor fi adăpate înainte de îmbăiere. Oile și caprele vor fi ținute în soluția de îmbăiere timp de 60 secunde, scufundând capul cel puțin o dată.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

A nu se îmbăia animale obosite sau însetate.

A nu se utiliza la cai.

Numai pentru uz extern.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În caz de supradozare accidentală (puțin probabilă), se poate observa sedarea animalului. În mod normal se așteaptă revenirea naturală fără intervenție clinică, dar dacă este necesar se va asigura terapia de susținere până la dispariția simptomelor.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe de bovine: 4 zile

Carne și organe de ovine și caprine : 24 zile

Carne și organe de porcine: 1 zi

Lapte de vacă: 4 zile

Lapte de ovine și caprine : Nu se va utiliza la capre și oi care produc lapte pentru consumul uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. A se păstra în containerul original, bine închis, într-un loc sigur, departe de alimente.

A se feri de îngheț.

Valabilitate:

A nu se utiliza după data expirării.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 8 săptămâni.

Perioada de valabilitate după diluare conform indicațiilor: 12 ore.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru utilizare la animale

A nu se îmbăia animale obosite sau însetate.

A nu se utiliza la cai.

Numai pentru uz extern.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

La manevrarea concentratului sau la pulverizare: Purtați salopete impermeabile, mănuși de cauciuc (neoprenic sau nitrilic, cu grosimea minimă de 0.5 mm), cizme de cauciuc și ecran protector pentru față, atunci când deschideți containerele, diluați sau pulverizați substanța diluată pe animale, sau la spălarea containerelor

goale.

La manevrarea concentratului de îmbăiere, la manevrarea soluției diluate de îmbăiere sau a oilor îmbăiate recent: Purtați mănuși de cauciuc (cu rezistență mare, din cauciuc nitrilic, de minim 300 mm lungime și 0.5 mm grosime), cizme de cauciuc, pantaloni sau colanți impermeabili și jachete sau șorțuri și ecran protector pentru față, la manevrarea concentratului sau a animalelor proaspăt tratate. Îmbăierea se va realiza într-un loc bine ventilat, de preferat afară.

Nu manevrați animale tratate fără a purta echipament de protecție, până la uscarea completă a robei acestora.

În momentul utilizării, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Nu inhalați particulele pulverizate. Evitați orice contact cu gura, pielea și ochii.

Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea.

La contactul cu pielea sau ochii, spălați imediat concentratul sau soluția pulverizată. După utilizare spălați temeinic tot echipamentul de protecție, mai ales interiorul mănușilor. Spălați mâinile și pielea expusă înainte de a mânca, bea sau fuma, sau la terminarea lucrului.

Pentru medic:

Amitraz NU este un compus organofosforic. Dacă se suspectează intoxicația cu amitraz, tratamentul trebuie să fie simptomatic și de susținere, acordând o atenție specială monitorizării funcției respiratorii și cardiace. Cu toate acestea revenirea este în mod normal spontană. A NU se folosi Atropină. A NU se induce voma.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Tactic nu va fi deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești. A nu se contamina lacuri, cursuri de apă sau canale. Containere vor fi golite complet și vor fi eliminate în condiții de siguranță. A nu se refolosi containerele goale.

14. ALTE INFORMAȚII

Utilizare în perioada de gestație sau lactație

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație

Prezentare: Flacoane de 250 ml, 1 litru și 5 litri, din poliamidă/polietilenă de înaltă densitate co-extrudate cu dop din polietilenă filetat.

Cutie cu un flacon de 250 ml.

Cutie cu 20 flacoane de 250 ml.

Cutie cu un flacon 1 litru.

Cutie cu 10 flacoane de 1 litru.

Cutie cu un flacon de 5 litri.

Cutie cu 5 flacoane de 5 litri.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
