



TOLTAROX
50 mg/ml suspensie orală pentru porci

**NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI
AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A
DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE
FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU
ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ
SUNT DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare/producer:
KPKA, d.d., Novomesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo
mesto, Slovenia

**DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL
VETERINAR**

Toltarox 50 mg/ml suspensie orală pentru porci
Toltaroxun

**DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR
ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE
(INGREDIENTI)**

1 ml de suspensie vâscoasă, de culoare albă, conține toltaroxun 50 mg, benzoat de sodiu 2,1 mg (E211) și propionat de sodiu 2,1 mg (E281).

INDICAȚIE (INDICAȚII)

Prevenția apariției semnelor clinice de coccidioză la purceii nou-născuți (cu vârsta de 3 - 5 zile)
în ferme cu antecedente confirmate de coccidioză produsă de *Isospora suis*.

CONTRAINDICAȚII

Nu există.

REAȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă
rugăm informați medicul veterinar.

SPECIIȚINTĂ

Suine (purceii cu vârsta de 3 - 5 zile).

**POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE
ADMINISTRARE**

Fiecare purcel trebuie tratat la vârsta de 3-5 zile cu o doză unică orală de 20 mg toltaroxun per
kg greutate corporală, ceea ce corespunde cu 0,4 ml suspensie orală per kg greutate
corporală.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Administrare orală.

Tratament individual.

Deoarece cantitățile solzute necesare în tratamentul individual al purcelor, se recomandă
utilizarea unui echipament de dozare cu acuratețe a dozei de 0,1 ml.

Agitați flaconul înainte de utilizare.

Într-un focar de coccidioză, tratamentul are valoare limitată pentru purceli, deoarece aceștia
deja prezintă leziuni la nivelul intestinului subțire.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carnă și organe: 77 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemână și vedere a copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 3 luni.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru utilizare la specie țintă

Similar altor antiparazitice, utilizarea frecventă și repetată a antiparazitelor din aceeași clasă
terapeutică poate duce la dezvoltarea rezistenței.

Interacțiunile medicamentelor și alte forme de interacțiune

Nu se cunosc. Exemplu: nu există interacțiuni la asocierea cu suplimente de fier.

Supradozare (simptome, tratament de urgență, antidot), dacă este cazul

Purceli sănătoși tolerează bine, fără semne de intoleranță, doze de trei ori mai mari decât doza
recomandată.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat
cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal
veterinar la animale.

La contactul accidental cu pielea sau ochii a produsului, spălați imediat cu apă.

**PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A
DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie
eliminate în conformitate cu cerințele naționale. Solicitați medicului veterinar informații
referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Acest
măsur contribuie la protecția mediului.

ALTE INFORMAȚII

Toltarox este disponibil în cutie cu flacon de 250 ml suspensie orală.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați
reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.