

Tripedin - Compozitie:

Un flacon cu pulbere pentru suspensie injectabila de uz veterinar contine benzilpenicilina potasica 300.000 U.I., benzilpenicilina procainica 300.000 U.I. si benzatin benzilpenicilina 600.000 U.I.

Indicatii:

Amestecul celor trei forme de penicilina asigura, imediat dupa administrare, o penicilinemie ridicata, determinata de benzilpenicilina potasica si de lunga durata, datorita benzilpenicilinei procainice si benzatinbenzilpenicilinei care se absorb si se elimina lent din organism, in timp de 48 - 72 ore.

Este indicat in infectii acute, subacute si cronice produse de germeni sensibili la penicilina cum sunt: pneumoniile, bronhopneumoniile, abcese, flegmoane, stari septice dupa fatare, leptospiroze la caini si pisici.

Contraindicatii:

Nu se administreaza in infectii produse de germeni rezistenti la penicilina.

Nu se administreaza la animalele cu hipersensibilitate anterior stabilita la peniciline si procaina.

Reactii adverse:

La ambele specii: reactii alergice, anafilaxie specifica, dermatita de contact, urticarie. Cea mai frecventa reactie este durerea la locul injectarii (in cazul dozelor mari).

Specii tinta:

Produsul este destinat pentru urmatoarele specii de animale: caini si pisici.

Doze si mod de administrare Administrarea se face intramuscular profund.

Caini si pisici: doza este de 10.000 - 20.000 U.I./kg greutate corporala, repetata la interval de 24-48 de ore.

Recomandari privind administrarea corecta:

Suspensia de Tripedin se prepara extemporaneu, folosindu-se, pentru un flacon, 4-6 ml apa distilata sau ser fiziologic. Suspensiile preparate cu apa distilata sunt mai dureroase la injectare.

Perioada de asteptare Nu este cazul.

Precautii speciale pentru depozitare

A nu se lasa la indemana si vederea copiilor.

A se pastra la temperaturi sub 25°C.

A se pastra in ambalajul original.

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj.

Atentionari speciale: Nu sunt.

Precautii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deseurilor, dupa caz Medicamentele nu trebuie aruncate in ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitati medicului veterinar informatii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste masuri contribuie la protectia mediului.

Mod de prezentare:

Cutie cu 50 sau 100 flacoane.

Perioada de valabilitate

2 ani, pastrat in ambalajul original.

Specie: caini si pisici