

Veteusan

100 mg/ml

Emulsie pentru aplicare
topică pentru câini
și pisici



richterpharma ag
Wels • Austria

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZĂȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZĂȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE
Deținătorul autorizației de comercializare:
Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria

Produsător pentru eliberarea seriei:
Richter Pharma AG, Dürnsolstraße 14, 4600 Wels, Austria

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
Veteusan 100 mg/ml - emulsie pentru aplicare topică pentru câini și pisici

Crotamiton

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml conține:

Substanță activă:

Crotamiton 100,00 mg

Excipienți:

Metil-p-hidroxibenzoat 0,65 mg, propil-p-hidroxibenzoat 0,35 mg, propilenglicol, emulsifiant pe bază de alcool cetilic stearic, triolamină, carbomer, apă purificată

4. INDICAȚII

Produsul este indicat la câini și pisici în tratamentul:

- Răiei (Sarcopes spp., Psoroptes spp., Chorioptes spp. și Notedres spp.)
- Demodexiei (numai în cazul foarte timpuriu)
- Infestației cu păduchi și purici
- Pruritului determinat de micoze, dermatoze și boli interne
- Eczemelor cronice

5. CONTRAINDICĂȚII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilizare la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

Acest produs medicinal de uz veterinar este în general bine tolerat.
Doar în cazuri rare pot să apară reacții alergice sau iritații ale pielii.

Crotamiton poate provoca reacții dureroase rar, în special în cazul administrării în afecțiuni inflamatorii recente, umede, ale pielii, care necesită un tratament umed.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII TINTĂ

Câinii, pisici

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se aplica și se freacă zonele afectate: 3-4 aplicații de produs, timp de 2-3 zile.

Pentru pisici Veteusan trebuie diluat cu aceeași cantitate de apă (1:1).

A nu se trata mai mult de 1/3 din suprafața corpului animalului o singură dată.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu există.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu se aplică.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederă copililor.

Acest medicament nu necesită condiții de temperatură speciale de păstrare.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului: 2 luni.

Odata deschis, depozitați flaconul în frigider (2°C-8°C).

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Pisicile reacționează ocazional hipersensibil (goc), când se tratează întregul corp (spălare, îmbăiere). Prin urmare, utilizați Veteusan pentru pisici numai diluat și frecat pe cel mult 1/3 din suprafața corpului. Blana animalului tratat nu devine lipicioasă sau în orice alt mod modificată, astfel încât tundera nu este necesară.

După ingestia accidentală, de exemplu prin intermediul linsului intens al zonelor tratate ale corpului, pot să apară vărsături temporare și inapetență.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Crotamitonul nu trebuie să intre în contact cu ochii sau mucoasele.

Când se tratează pleoapele este necesar să se protejeze corneea cu vaselină neutră.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

După aplicarea tratamentului spălați-vă mâinile. A se evita contactul cu ochii. În caz de contact accidental al ochilor, rugăm clătiți bine cu apă. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la Crotamiton trebuie să evite contactul cu acest produs de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Significanța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației. De asemenea, nu se cunoaște, dacă Crotamiton trece în lapte. De aceea utilizați numai conform evaluării raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În caz de suspiciune de supradozare, de exemplu, ca urmare a aplicării exagerate la pisici, aplicarea trebuie oprită. În astfel de cazuri sau în caz de iritare a mucoasei după ingestia unei mari cantități prin intermediul linsului blăni de către animal, poate fi recomandat numai un tratament simptomatic.

Incompatibilități

Nu se cunosc.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

08.06.2012

15. ALTE INFORMAȚII

Proprietăți farmacodinamice
Veteusan are o acțiune acericidă, antipruriginosă și bacteriostatică.

Acțiunea acericidă:

Această acțiune poate fi demonstrată pe acarienii demodexici, cu concentrații de 10 % Crotamiton. Maximul de efect de imobilizare este atins după 10 minute.

Acțiunea bacteriostatică:

Cu 5 mg Crotamiton = 0,05 ml Veteusan poate fi demonstrat efectul inhibitor al creșterii pentru streptococi și stafilococi.

Acțiunea antipruriginosă:

Pruritului înseamnă o perturbare a reacțiilor vasomotorii, precum și senzația de căldură și de durere. Testele senzorial-fiziologice pe pielea umană au arătat că Crotamiton elimină sau reduce pruritul, fără a influența alte calități senzoriale ale pielii. Deși Veteusan nu este antagonist histaminic, depășește efectul antipruriginos al antihistaminicilor. Efectul se instalează în scurt timp și după aplicare în mod normal persistă timp de 6 ore. Veteusan este bine tolerat de piele, are proprietăți bune de permeabilitate, pătrunzând rapid în piele.

Particularități farmacocinetice

După aplicarea topică la om și iepuri o cantitate mică de Crotamiton a fost determinată în plasmă și urină. Pentru animalele țintă nu sunt cunoscute studii în literatura de specialitate.

Dimensiunea ambalajului:

Cute de carton x 1 flacon x 100 ml

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Richter Pharma s.r.l.,
Calea Șerban Voda nr. 195
040206, București
Tel: +40 21 3365428
richterpharma@clicknet.ro