

VETMEDIN 5 mg, capsule pentru caini

Pimobendan

DECLARAREA SUBSTANTEI ACTIVE SI A ALTOR INGREDIENTE

Fiecare capsula contine:

Substanta activa:

Pimobendan 5 mg / capsula

INDICATII

Tratamentul insuficientei cardiace congestive la caine, cu origine in cardiomiopatia dilatativa sau insuficienta valvulara (mitrala si / sau regurgitarea tricuspidala).

CONTRAINDICATII:

Nu trebuie utilizat in cazuri de cardiomiopatie hipertrofica sau conditii clinice in care o crestere a randamentului cardiac nu este posibila, din cauze functionale sau anatomice (de exemplu steniza aortica).

REACTII ADVERSE

Un efect cronotrop pozitiv moderat si vomă pot apare in cazuri rare.

Totusi, aceste efecte sunt dependente de doza si pot fi evitate prin reducerea dozei in aceste cazuri.

In cazuri rare s-au observat diaree tranzitorie, anorexie sau letargie.

Daca observati reactii grave sau alte efecte care nu sunt mentionate in acest prospect, va rugam informati medicul veterinar.

SPECII TINTA

Caini

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) SI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru administrarea pe cale orala, in doze de 0,2 mg la 0,6 mg Pimobendan / kg greutate corporala pe zi. Doza zilnica recomandata este de 0,5 Pimobendan / kg greutate corporala. Doza trebuie sa fie impartita in doua administrari (0,25 mg / kg fiecare), o jumatate din doza de dimineata si cealalta jumatate la aproximativ 12 ore mai tarziu.

Se va determina cu exactitate greutatea corporala inainte de a se prescrie Vetmedin 5 mg, pentru a se asigura administrarea corecta a dozei.

In cazuri usoare de insuficienta cardiaca se va administra o doza zilnica la limita inferioara.

Daca nu se observa un raspuns adecvat in termen de o saptamana se va creste doza.

RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA

Fiecare doza trebuie administrata cu cel putin o ora inainte de hranire. Vetmedin capsule poate fi combinat cu un tratament diuretic, cum ar fi furosemid.

TIMP DE ASTEPTARE

Nu este cazul

PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se pastra la temperaturi peste 25°C.

A se pastra flaconul bine inchis pentru a se proteja de umiditate.

A nu se utiliza dupa data de expirare mentionata pe cutie / flacon.

A nu se lasa la indemana copiilor

ATENTIONARI SPECIALE:

Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale

In caz de ingerare accidentala, solicitati imediat sfatul medicului si prezantati acestuia prospectul sau eticheta produsului.

Utilizarea in perioada de gestatie, lactatie sau in perioada de ouat.

In studiile cu sobolani si iepuri pimobendanul nu a avut nici un efect asupra fertilitatii. Efecte embriotoxice s-au produs numai la doze maternotoxice. In experimentele pe sobolani s-a demonstrat ca Pimobendan se excreta in lapte. Administrati la catele gestante si care alapteaza numai in cazul in care beneficiile terapeutice asteptate depasesc riscul potential (vezi, de asemenea capitolul Contraindicatii).

Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune:

In studiile farmacologice nu a fost detectata nici o interactiune intre glicozidul cardiac ouabain si Pimobendan. Cresterea contractilitatii inimii indusa de Pimobendan este atenuata, in prezenta antagonistului de calciu verapamil si beta-antagonistului propranolol.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi), daca este necesar.

In caz de supradozare, trebuie initiat tratamentul simptomatic.

ALTE INFORMATII

Dimensiunea ambalajului: 100 de capsule.